

Proposition de corrigé de l'épreuve de Math 1 du C.N.C.M., section MP, année : 2015.

Mohammed ICHEHA* Mohamed AIT LHOUSSAIN†

10 juin 2015

Problème I

Partie I

1.1. Montrons que Σ_A est un espace vectoriel.

• **Première méthode :**

Σ_A est une partie de l'espace vectoriel réel $(\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}))^{\mathbb{R}_+}$ des applications de \mathbb{R}_+ vers $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$, donc il suffit de prouver que Σ_A est un sous-espace vectoriel de $(\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}))^{\mathbb{R}_+}$.

i) $\Sigma_A \neq \emptyset$

En effet la fonction nulle $\Theta : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}), t \mapsto 0$ est un élément de Σ_A puisque Θ est deux fois dérivable sur \mathbb{R}_+ et :

$$\forall t \in \mathbb{R}_+, \Theta''(t) = 0 = A(t)\Theta(t).$$

ii) Stabilité par combinaison linéaire :

Soit $F, G \in \Sigma_A$ et $\lambda \in \mathbb{R}$ alors $\lambda F + G \in \Sigma_A$ car $\lambda F + G$ est deux fois dérivable sur \mathbb{R}_+ et pour tout $t \in \mathbb{R}_+$, on a :

$$\begin{aligned}(\lambda F + G)''(t) &= \lambda F''(t) + G''(t) \\ &= \lambda A(t)F(t) + A(t)G(t) \\ &= A(t)(\lambda F(t) + G(t)) \\ &= A(t)((\lambda F + G)(t)).\end{aligned}$$

• **Deuxième méthode :**

On note $\mathcal{D}^2(\mathbb{R}_+, \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}))$ l'espace vectoriel des applications de \mathbb{R}_+ vers $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ deux fois dérivables sur \mathbb{R}_+ . Soit $T : \mathcal{D}^2(\mathbb{R}_+, \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})) \rightarrow \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})^{\mathbb{R}_+}, F \mapsto T(F)$ avec :

$$\forall t \in \mathbb{R}_+, T(F)(t) = F''(t) - A(t)F(t).$$

Alors T est une application linéaire car pour tout $F, G \in \mathcal{D}^2(\mathbb{R}_+, \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}))$ et $\lambda \in \mathbb{R}$, on a pour tout $t \in \mathbb{R}_+$:

$$\begin{aligned}T(\lambda F + G)(t) &= (\lambda F + G)''(t) - A(t)(\lambda F + G)(t) \\ &= \lambda(F''(t) - A(t)F(t)) + (G''(t) - A(t)G(t)) \\ &= \lambda T(F)(t) + T(G)(t) = (\lambda T(F) + T(G))(t),\end{aligned}$$

*Centre Omar Ibn Lkhattab , Meknes, Maroc

†Centre Salmane El Farissi , Salé, Maroc

ce qui veut dire : $T(\lambda F + G) = \lambda T(F) + T(G)$.

On a : $\Sigma_A = \ker T$ car $\Sigma_A \subset \mathcal{D}^2(\mathbb{R}_+, \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}))$ et, pour tout $F \in \mathcal{D}^2(\mathbb{R}_+, \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}))$, on a

$$\begin{aligned} F \in \ker T &\Leftrightarrow T(F) = 0 \\ &\Leftrightarrow \forall t \in \mathbb{R}_+, T(F)(t) = 0 \\ &\Leftrightarrow \forall t \in \mathbb{R}_+, F''(t) - A(t)F(t) = 0 \\ &\Leftrightarrow \forall t \in \mathbb{R}_+, F''(t) = A(t)F(t) \\ &\Leftrightarrow F \in \Sigma_A. \end{aligned}$$

donc Σ_A est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{D}^2(\mathbb{R}_+, \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}))$, en particulier Σ_A est un espace vectoriel sur \mathbb{R} .

1.2.

1.2.1.

$$\begin{aligned} x_F \in \Sigma_B &\Leftrightarrow x'_F = B(t)x_F \\ &\Leftrightarrow \begin{pmatrix} F' \\ F'' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & I_n \\ A(t) & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} F \\ F' \end{pmatrix} \\ &\Leftrightarrow \begin{pmatrix} F' \\ F'' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} F' \\ A(t)F \end{pmatrix} \\ &\Leftrightarrow F'' = A(t)F \\ &\Leftrightarrow F \in \Sigma_A \end{aligned}$$

Ainsi $x_F \in \Sigma_B \Leftrightarrow F \in \Sigma_A$.

1.2.2.

• Φ linéaire : Soit $F, G \in \Sigma_A$ et $\lambda \in \mathbb{R}$, alors :

$$\begin{aligned} \Phi(\lambda F + G) &= \begin{pmatrix} \lambda F + G \\ (\lambda F + G)' \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \lambda F + G \\ \lambda F' + G' \end{pmatrix} \\ &= \lambda \begin{pmatrix} F \\ F' \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} G \\ G' \end{pmatrix} \\ &= \lambda \Phi(F) + \Phi(G) \end{aligned}$$

• Φ injectif : Soit $F \in \ker \Phi$ alors $\Phi(F) = x_F = 0$, donc $\begin{pmatrix} F \\ F' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, donc $F = F' = 0$, en particulier, $F = 0$. Donc Φ est injectif.

• Φ surjectif : Soit $y \in \Sigma_B$ alors y est une solution du système différentiel $x' = B(t)x$. Posons $y = \begin{pmatrix} F \\ G \end{pmatrix}$ avec $F, G \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})^{\mathbb{R}_+}$, donc F et G sont dérivables sur \mathbb{R}_+ et :

$$\begin{pmatrix} F' \\ G' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & I_n \\ A(t) & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} F \\ G \end{pmatrix},$$

donc $F' = G$ et $G' = A(t)F$, cela donne en particulier F deux fois dérivable et $F'' = A(t)F$ donc $F \in \Sigma_A$ et $y = \begin{pmatrix} F \\ F' \end{pmatrix} = \Phi(F)$.

Ainsi, $\exists F \in \Sigma_A, y = x_F = \Phi(F)$ donc Φ est surjectif.

Conclusion : Φ est un isomorphisme d'espaces vectoriels.

1.2.3. L'application $B : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathcal{M}_{2N}(\mathbb{R})$ est continue. D'après le théorème de Cauchy-Lipschitz linéaire $\dim \Sigma_B = \dim(\mathcal{M}_{2n,1}(\mathbb{R})) = 2n$. Comme Σ_A et Σ_B sont isomorphes, on a $\dim \Sigma_A = 2n$.

1.3.

Soit $y_0 = \begin{pmatrix} v \\ w \end{pmatrix}$ alors $y_0 \in \mathcal{M}_{2n,1}(\mathbb{R})$.

• **Existence** : Par le théorème de Cauchy-Lipschitz, il existe une et une seule solution $x \in \Sigma_B$ tel que $x(s) = y_0$. Soit $F = \Phi^{-1}(x)$, donc $x = x_F = \begin{pmatrix} F \\ F' \end{pmatrix}$, alors $\begin{pmatrix} v \\ w \end{pmatrix} = x(s) = \begin{pmatrix} F(s) \\ F'(s) \end{pmatrix}$ de sorte que $F(s) = v$ et $F'(s) = w$. On a donc trouvé $F \in \Sigma_A$ tel que $F(s) = v$ et $F'(s) = w$.

• **Unicité** : soit $G \in \Sigma_A$ tel que $G(s) = v$ et $G'(s) = w$, alors $x_G = \begin{pmatrix} G \\ G' \end{pmatrix}$ est un élément de Σ_B qui vérifie $x_G(s) = y_0$. Par unicité (Théorème de Cauchy-Lipschitz) on a $x_G = x$ donc $G = F$.

Partie II

2.1.

2.1.1.

Pour tout $t \in \mathbb{R}_+$, on a : $f(t) = \langle F(t), F(t) \rangle$. F est deux fois dérivable sur \mathbb{R}_+ et l'application $(x, y) \mapsto \langle x, y \rangle$ est bilinéaire continue sur $(\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}))^2$, donc par composition, f est deux fois dérivable sur \mathbb{R}_+ et pour tout $t \in \mathbb{R}_+$, $\begin{cases} f'(t) = 2\langle F(t), F'(t) \rangle \\ f''(t) = 2\langle F(t), F''(t) \rangle + 2\|F'(t)\|^2 \end{cases}$. Comme $F \in \Sigma_A$, on a aussi, pour tout $t \in \mathbb{R}_+$, $f''(t) = 2\langle A(t)F(t), F(t) \rangle + 2\|F'(t)\|^2$

2.1.2.

On sait par hypothèse que $\langle A(t)F(t), F(t) \rangle \geq 0$ pour tout $t \in \mathbb{R}_+$, donc, compte tenu de l'expression ci-dessus de $f''(x)$, on a : $f'' \geq 0$ sur \mathbb{R}_+ et par suite f est convexe.

2.2.

2.2.1.

Soit $t \in [t_1, t_2]$, alors il existe $\tau \in [0, 1]$ tel que $t = (1 - \tau)t_1 + \tau t_2$ alors, et compte tenu de $f(t_1) = f(t_2) = 0$, on a :

$$0 \leq f(t) \leq (1 - \tau)f(t_1) + \tau f(t_2) = 0,$$

ce qui donne $f(t) = 0$.

2.2.2. On a $F = 0$ sur $[t_1, t_2]$, donc $F' = 0$ sur $[t_1, t_2]$ donc en posant $s = t_1$ on a :

$$x_F(s) = \begin{pmatrix} F(s) \\ F'(s) \end{pmatrix} = 0$$

Il en découle que x_F est une solution du problème de Cauchy :

$$(\mathcal{C}) \quad \begin{cases} x' = B(t)x \\ x(s) = 0 \end{cases}$$

Or la fonction nulle est une solution de (\mathcal{C}) . Par unicité de la solution de (\mathcal{C}) on a $x_F = 0$, donc $\Phi(F) = 0$, donc $F = 0$, puisque Φ est injectif.

2.3. Dans tout ce qui suit on notera $f_v = \|F_v\|^2$. On va proposer deux méthodes pour répondre à cette question.

• **Première méthode :**

La tangente au graphe de f_v en 0 est au dessous de ce graphe, donc $\forall t \in \mathbb{R}_+, f_v(t) \geq f'_v(0)t + f_v(0)$ or $f'_v(0) = 2\langle F_v(0), F'_v(0) \rangle = \|v\|^2 > 0$ et $f_v(0) = \|v\|^2$ donc $\forall t \in \mathbb{R}_+, f_v(t) \geq \|v\|^2 t + \|v\|^2$ avec $\lim_{t \rightarrow +\infty} \|v\|^2 t + \|v\|^2 = +\infty$, d'où $\lim_{t \rightarrow +\infty} f_v(t) = +\infty$, et comme $\|F_v\| = \sqrt{f_v}$, on a : $\lim_{t \rightarrow +\infty} \|F_v(t)\| = +\infty$

• **Deuxième méthode :**

On a $f'_v(0) = \langle F_v(0), F'_v(0) \rangle = \|v\|^2$. Comme $v \neq 0$, on a alors $f'_v(0) > 0$. Par ailleurs, f'_v est croissante sur \mathbb{R}_+ car $f''_v \geq 0$ alors : $\forall t \in \mathbb{R}_+, f'_v(t) \geq f'_v(0) = \|v\|^2 > 0$. Comme f_v est convexe sur \mathbb{R}_+ , l'application $\varphi : t \mapsto \frac{f_v(t) - f_v(0)}{t}$ est croissante sur \mathbb{R}_+ , en particulier on a pour tout $t \geq 1$: $\varphi(t) \geq \varphi(1)$, or $\varphi(1) = f_v(1) - f_v(0)$. Posons $A = f_v(1) - f_v(0)$ et montrons que $A > 0$: Par le théorème des accroissements finis il existe $c \in]0, 1[$ tel que $A = f'_v(c)$ et on sait que $f'_v > 0$ sur \mathbb{R}_+ . Ainsi :

$$\forall t \geq 1, \quad f_v(t) \geq At + f_v(0)$$

et comme $\lim_{t \rightarrow +\infty} (At + f_v(0)) = +\infty$, on a $\lim_{t \rightarrow +\infty} f_v(t) = +\infty$ et comme $\|F_v\| = \sqrt{f_v}$, on a : $\lim_{t \rightarrow +\infty} \|F_v(t)\| = +\infty$

2.4.

2.4.1. L'application Ψ est linéaire car si $F, G \in \Sigma_A$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ alors :

$$\Psi(\lambda F + G) = ((\lambda F + G)(0), (\lambda F + G)(b)) = \lambda(F(0), F(b)) + (G(0), G(b)) = \lambda\Psi(F) + \Psi(G)$$

- Montrons que Ψ est injective : Si $F \in \ker \Psi$ alors $F \in \Sigma_A$ et $F(0) = F(b) = 0$. D'après le résultat de la question 2.2. appliqué à $t_1 = 0$ et $t_2 = b$ (on a bien $0 = t_1 < t_2 = b$), on a $F = 0$.
- Comme $\dim \Sigma_A = \dim (\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}) \times \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})) (= 2n)$, l'application linéaire Ψ est un isomorphisme d'espaces vectoriels.

2.4.2. Avant de montrer que $\|\cdot\|_b$ est une norme, remarquons¹ tout d'abord que $\|\cdot\|_b$ est à valeurs dans \mathbb{R}_+ .

Démontrons ensuite que $\|\cdot\|_b$ vérifie les axiomes d'une norme :

- Soit $F \in \Sigma_A$ tel que $\|F\|_b = 0$ alors $\|F(0)\| + \|F(b)\| = 0$, donc $\|F(0)\| = \|F(b)\| = 0$, c'est-à-dire $F(0) = F(b) = 0$. En appliquant le résultat de la question 2.2. pour $(t_1, t_2) = (0, b)$ (puisque $0 < b$), on a F est nulle sur \mathbb{R}_+ .
- Pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$ et $F \in \Sigma_A$, on a :

$$\begin{aligned} \|\lambda F\|_b &= \|(\lambda F)(0)\| + \|(\lambda F)(b)\| \\ &= \|\lambda F(0)\| + \|\lambda F(b)\| \\ &= |\lambda| (\|F(0)\| + \|F(b)\|) \quad (\text{homogénéité pour } \|\cdot\|) \\ &= |\lambda| \|F\|_b. \end{aligned}$$

1. En fait une application $\nu : E \rightarrow \mathbb{R}$ d'un espace vectoriel E vers \mathbb{R} vérifiant l'homogénéité et l'inégalité triangulaire est nécessairement à valeurs dans \mathbb{R}_+ . En effet, si c'est le cas alors :

- D'après l'homogénéité, $\nu(0) = \nu(0.0) = 0.\nu(0) = 0$.

- Pour tout $x \in E$, on a par l'inégalité triangulaire : $0 = \nu(0) = \nu(x-x) \leq \nu(x) + \nu(-x) = 2\nu(x)$ (on a $\nu(-x) = \nu(x)$ par homogénéité). Donc $\nu(x) \geq 0$.

• Pour tout $F, G \in \Sigma_A$, on a :

$$\begin{aligned}
\|F + G\|_b &= \|(F + G)(0)\| + \|(F + G)(b)\| \\
&= \|F(0) + G(0)\| + \|F(b) + G(b)\| \\
&\leq \|F(0)\| + \|G(0)\| + \|F(b)\| + \|G(b)\| \quad (\text{inégalité triangulaire pour } \|\cdot\|) \\
&= (\|F(0)\| + \|F(b)\|) + (\|G(0)\| + \|G(b)\|) \\
&= \|F\|_b + \|G\|_b.
\end{aligned}$$

Donc $\|\cdot\|_b$ est bien une norme sur Σ_A .

2.4.3. Remarquons d'abord que $\|\cdot\|_{\infty,b}$ est bien définie car toute fonction F élément de Σ_A est continue sur le compact $[0, b]$ donc F est bornée sur $[0, b]$.

• Séparation : Soit $F \in \Sigma_A$ tel que $\|F\|_{\infty,b} = 0$. Puisque $\forall t \in [0, b]$, $0 \leq \|F(t)\| \leq \|F\|_{\infty,b} = 0$ alors $\forall t \in [0, b]$, $F(t) = 0$; en particulier on a $F(0) = F(b) = 0$ et $0 < b$. Donc par la question 2.2 on conclut que $F = 0$.

• Homogénéité : Soit $F \in \Sigma_A$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. On suppose à présent que $\lambda \neq 0$. Pour tout $t \in [0, b]$, on a : $\|(\lambda F)(t)\| = |\lambda| \|F(t)\| \leq |\lambda| \sup_{\tau \in [0, b]} \|F(\tau)\| = |\lambda| \|F\|_{\infty,b}$. Il en résulte, que :

$$\|(\lambda F)\|_{\infty,b} \leq |\lambda| \|F\|_{\infty,b}. \quad (1)$$

En appliquant (1) à $F_1 = \lambda F$ et $\lambda_1 = \frac{1}{\lambda}$, on obtient :

$$\left\| \frac{1}{\lambda} (\lambda F) \right\|_{\infty,b} \leq \frac{1}{|\lambda|} \|\lambda F\|_{\infty,b} \quad (2)$$

Combinant (1) et (2), on obtient $\|\lambda F\|_{\infty,b} = |\lambda| \|F\|_{\infty,b}$, valable aussi pour $\lambda = 0$. Ainsi on a :

$$\forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall F \in \Sigma_A, \|\lambda F\|_{\infty,b} = |\lambda| \|F\|_{\infty,b}$$

• Inégalité triangulaire : Soit $F, G \in \Sigma_A$, alors comme $\|\cdot\|$ est une norme sur $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$, on a :

$$\forall t \in [0, b], \|F(t) + G(t)\| \leq \|F(t)\| + \|G(t)\| \leq \|F\|_{\infty,b} + \|G\|_{\infty,b}$$

Par passage au sup, on obtient :

$$\|F + G\|_{\infty,b} \leq \|F\|_{\infty,b} + \|G\|_{\infty,b}$$

Conclusion : $\|\cdot\|_{\infty,b}$ est une norme sur Σ_A .

2.4.4. Comme Σ_A est un espace vectoriel réel de dimension finie, toutes les normes de Σ_A sont équivalentes en particulier les deux normes ci-dessus sont équivalentes.

Partie III

3.1.

3.1.1. Comme $g_{m,a} \in \Sigma_A$, on a vu dans la question 2.1.2. que si on considère la fonction g définie par $g(t) = \|g_{m,a}\|^2$ pour tout $t \in \mathbb{R}_+$, alors $g'' \geq 0$ et par suite g' est croissante sur \mathbb{R}^+ . Or $g'(m) = 2\langle g_{m,a}(m), g'_{m,a}(m) \rangle = 2\langle 0, g'_{m,a}(m) \rangle = 0$, donc $g' \leq 0$ et g est décroissante sur \mathbb{R}_+ . Comme g et $\|g_{m,a}\|$ ont la même monotonie, alors $\|g_{m,a}\|$ est elle aussi décroissante sur \mathbb{R}_+ .

3.1.2. On a $\|g_{m,a}\|_1 = \|g_{m,a}(0)\| + \|g_{m,a}(1)\|$. D'après la question 3.1.1, $t \mapsto \|g_{m,a}(t)\|$ est décroissante sur $[0, m]$. Comme $1 \leq m$, on a donc : $\|g_{m,a}(1)\| \leq \|g_{m,a}(0)\| = \|a\|$, ce qui donne : $\|g_{m,a}\|_1 \leq 2\|a\|$ et montre que la suite $(g_{m,a})_{m \geq 1}$ est bornée dans l'espace vectoriel normé $(\Sigma_A, \|\cdot\|_1)$.

3.1.3. $(\Sigma_A, \|\cdot\|_1)$ est un espace vectoriel normé de dimension finie et $(g_{m,a})_{m \geq 1}$ est une suite bornée d'éléments de Σ_A . D'après le théorème de Bolzano-Weierstrass, il existe une sous-suite $(g_{\sigma(m),a})_{m \geq 1}$ qui converge dans $(\Sigma_A, \|\cdot\|_1)$ vers un élément g_a . Soulignons qu'en particulier, $g_a \in \Sigma_A$, ce qui veut dire que g_a est une solution de l'équation différentielle (1).

3.2.

On conserve les notations de la question 3.1. précédente.

3.2.1. Soit K un compact de \mathbb{R}_+ , il existe $b > 0$ tel que $K \subset [0, b]$. D'après la question 2.4.4., on dispose des normes $\|\cdot\|_{\infty,b}$ et $\|\cdot\|_1$ sur Σ_A et elles sont équivalentes car Σ_A est de dimension finie. Comme $K \subset [0, b]$, on a :

$$(\star) \quad \sup_{t \in K} \|g_{\sigma(m),a}(t) - g_a(t)\| \leq \|g_{\sigma(m),a} - g_a\|_{\infty,b}$$

Par ailleurs $\|\cdot\|_1$ et $\|\cdot\|_{\infty,b}$ étant équivalentes et $(g_{\sigma(m),a})_{m \geq 1}$ converge vers g_a pour $\|\cdot\|_1$, cette convergence a lieu pour $\|\cdot\|_{\infty,b}$. Donc, par (\star) ci-dessus, on a :

$$\lim_{m \rightarrow +\infty} \sup_{t \in K} \|g_{\sigma(m),a}(t) - g_a(t)\| = 0$$

Par conséquent, la suite $(g_{\sigma(m),a})_{m \geq 1}$ converge uniformément sur K vers g_a .

3.2.2. Puisque $(g_{\sigma(m),a}(0))_{m \in \mathbb{N}^*}$ converge uniformément vers g_a sur tout compact de \mathbb{R}_+ , elle converge simplement vers g_a sur \mathbb{R}_+ , donc : $\lim_{m \rightarrow +\infty} g_{\sigma(m),a}(0) = g_a(0)$, et comme $\forall m \in \mathbb{N}^*, g_{\sigma(m),a}(0) = a$, on a : $g_a(0) = a$.

L'application $\|g_a\|$ est décroissante ; en effet soit $t_1, t_2 \in \mathbb{R}_+$ tel que $t_1 \leq t_2$. Il existe $m_0 \in \mathbb{N}^*$ tel que $t_2 \leq m_0$. Pour tout $m \geq m_0$ on a donc $t_1, t_2 \in [0, \sigma(m)] = I_m$. On sait d'après la question 3.1.1. que $\|g_{\sigma(m),a}\|$ est décroissante sur I_m , par suite : $\|g_{\sigma(m),a}(t_2)\| \leq \|g_{\sigma(m),a}(t_1)\|$, et par passage à la limite, quand $m \rightarrow +\infty$, on obtient $\|g_a(t_2)\| \leq \|g_a(t_1)\|$, ce qui montre que g_a est décroissante sur \mathbb{R}_+ .

3.2.3. On sait déjà que g_a est une solution de l'équation différentielle (1), puisque $g_a \in \Sigma_A$ d'après la question 3.1.3. Il reste à démontrer qu'elle est bornée. Or on a $\|g_a\|$ est décroissante sur \mathbb{R}_+ , donc :

$$\forall t \in \mathbb{R}_+, \quad \|g_a(t)\| \leq \|g_a(0)\| = \|a\|$$

Donc g_a est une solution bornée de l'équation différentielle (1).

3.3. Toutes les notations sont conservées.

3.3.1. Soit $g = \sum_{i=1}^n \alpha_i g_{e_i} \in \Sigma_1$. Remarquons qu'effectivement $g \in \Sigma_A$ comme le dit l'énoncé car pour tout $i \in [1, n]$, $g_{e_i} \in \Sigma_A$. De plus, pour tout $i \in [1, n]$, g_{e_i} est bornée car $e_i \neq 0$. Donc g est bornée. On conclut alors que tout élément de Σ_1 est une solution bornée de l'équation différentielle (1)

3.3.2. Il suffit de montrer que la famille $(g_{e_1}, \dots, g_{e_n})$ est libre car c'est une famille génératrice de Σ_1 . Soit alors $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{R}$ tel que $\sum_{i=1}^n \alpha_i g_{e_i} = 0$ alors $\sum_{i=1}^n \alpha_i g_{e_i}(0) = 0 = \sum_{i=1}^n \alpha_i e_i$, donc $\alpha_1 = \dots = \alpha_n = 0$ par liberté de (e_1, \dots, e_n) .

3.3.3. Soit $T : \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}) \rightarrow \Sigma_A, v \mapsto T(v) = F_v$

Montrons que T est linéaire, pour cela soit $v, w \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ et $\lambda \in \mathbb{R}$.

On a : $\lambda F_v + F_w \in \Sigma_A$ et $(\lambda F_v + F_w)(0) = (\lambda F_v + F_w)'(0) = \lambda v + w$, donc par définition

$$\lambda F_v + F_w = F_{\lambda v + w}$$

Ainsi on a :

$$T(\lambda v + w) = \lambda T(v) + T(w)$$

On a $\text{Im}(T) = \Sigma_2$.

T est injective car si $v \in \ker T$, cela veut dire que $T(v) = F_v = 0$ donc $F_v(0) = 0$. Or $F_v(0) = v$, d'où $v = 0$.

Il découle de tout ce qui précède que Σ_2 est un sous-espace vectoriel de Σ_A isomorphe à $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$. En particulier on a $\dim \Sigma_2 = n$.

3.3.4. Comme $\dim \Sigma_1 + \dim \Sigma_2 = \dim \Sigma_A$, il suffit de prouver que $\Sigma_1 \cap \Sigma_2 = \{0\}$. Pour cela soit $g \in \Sigma_1 \cap \Sigma_2$, alors il existe $v \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ tel que $g = F_v$ et g est bornée. D'après la question 2.3, on a $v = 0$ car sinon $\|g\|$ aurait une limite infinie en $+\infty$, ce qui contredit qu'elle est bornée. Donc $v = 0$ et par suite $g = F_0 = 0$. Donc :

$$\Sigma_A = \Sigma_1 \oplus \Sigma_2.$$

3.3.5. Comme Σ_1 est un sous-espace vectoriel de Σ_A de dimension finie, il est fermé dans Σ_A donc $\Sigma_A \setminus \Sigma_1$ est un ouvert de Σ_A .

• Densité : Soit $\varphi \in \Sigma_A$: On va montrer qu'il existe une suite $(\psi_p)_{p \geq 1}$ d'éléments de $\Omega = \Sigma_A \setminus \Sigma_1$ tel que $\psi_p \rightarrow \varphi$ dans $(\Sigma_A, \|\cdot\|_1)$ (toutes les normes sur Σ_1 étant équivalentes, n'importe quelle autre norme sur Σ_A convient).

Si $\varphi \in \Omega$ la suite constante définie par : $\psi_p = \varphi$, pour tout $p \in \mathbb{N}^*$, convient.

Si $\varphi \notin \Omega$ alors $\varphi \in \Sigma_1$. Comme $\Sigma_1 \neq \Sigma_A$ ($n < 2n$ car $n \in \mathbb{N}^*$), on a $\Omega \neq \emptyset$, soit alors $\omega \in \Omega$. Soit $(\psi_p)_{p \geq 1}$ la suite définie par $\psi_p = \varphi + \frac{1}{p}\omega$, pour tout $p \in \mathbb{N}^*$, alors :

- Pour tout $p \in \mathbb{N}^*$, on a $\psi_p \in \Omega$. En effet s'il existe $p \in \mathbb{N}^*$ tel que $\psi_p \notin \Omega$ alors $\psi_p \in \Sigma_1$ donc $\omega = p(\psi_p - \varphi) \in \Sigma_1$, ce qui contredit le fait que $\omega \in \Omega$.

- Pour tout $p \in \mathbb{N}^*$, on a : $\|\psi_p - \varphi\|_1 = \frac{1}{p} \|\omega\|_1$, donc $\|\psi_p - \varphi\|_1 \xrightarrow{p \rightarrow +\infty} 0$.

Il résulte de cette étude que tout élément φ de Σ_A est limite d'une suite $(\psi_p)_{p \geq 1}$ à valeurs dans $\Omega = \Sigma_A \setminus \Sigma_1$. Donc $\Sigma_A \setminus \Sigma_1$ est dense dans Σ_A .

• Soit F une solution de (1) .

- Si $F \in \Sigma_1$ alors d'après la question 3.3.1. on a F est bornée.

- Si $F \in \Sigma_A \setminus \Sigma_1$ alors $F = G_1 + G_2$ avec $G_1 \in \Sigma_1$ et $G_2 \in \Sigma_2$ non nulle donc G_2 s'écrit $G_2 = F_v$ avec $v \neq 0$. D'après la question 2.3. on a $\lim_{t \rightarrow +\infty} \|G_2(t)\| = +\infty$. Pour tout $t \in \mathbb{R}_+$, on a :

$$\|F(t)\| = \|G_1(t) + G_2(t)\| \geq \|G_2(t)\| - \|G_1(t)\| \geq \|G_2(t)\| - M$$

où $M = \sup_{t \in \mathbb{R}_+} \|G_1(t)\|$ qui existe puisque $G_1 \in \Sigma_1$, donc G_1 est bornée sur \mathbb{R}_+ .

On a $\lim_{t \rightarrow +\infty} (\|G_2(t)\| - M) = +\infty$, donc $\lim_{t \rightarrow +\infty} (\|F(t)\|) = +\infty$.

Problème II

Partie I : Fonctions harmoniques sur le graphe \mathbb{Z}^d

4.1. Soit $k \in \mathbb{Z}$. On a : $V(k) = \{\ell \in \mathbb{Z} / \|\ell - k\|_1 = 1\}$. Or pour tout $\ell \in \mathbb{Z}$, on a $\|\ell - k\|_1 = |\ell - k|$, donc $\|\ell - k\|_1 = 1 \Leftrightarrow |\ell - k| = 1 \Leftrightarrow (\ell - k = 1 \text{ ou } \ell - k = -1) \Leftrightarrow (\ell = k + 1 \text{ ou } \ell = k - 1)$, donc : $V(k) = \{k - 1, k + 1\}$. Ainsi, $I(\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}$.

Soit $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R}$ alors, compte tenu de $V(k) = \{k + 1, k - 1\}$ obtenue ci-dessus pour tout $k \in \mathbb{Z}$ et la définition de f harmonique, on a :

$$\begin{aligned} f \text{ harmonique sur } \mathbb{Z} &\Leftrightarrow \forall k' \in \mathbb{Z}, \quad f(k') = \frac{1}{2}(f(k'+1) + f(k'-1)) \\ &\Leftrightarrow \forall k' \in \mathbb{Z}, f(k'+1) = 2f(k') - f(k'-1) \\ &\Leftrightarrow \forall k \in \mathbb{Z}, f(k+2) = 2f(k+1) - f(k) \quad (\star) \end{aligned}$$

(\star) étant justifié par le changement de variable bijectif : $k = k' + 1$.

Conclusion : Une applications $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R}$ est harmonique si et seulement si elle vérifie :

$$\forall k \in \mathbb{Z}, \quad f(k+2) = 2f(k+1) - f(k) \quad (3)$$

4.2. Structure d'espace vectoriel : Notons \mathcal{E} l'ensemble des applications harmoniques sur \mathbb{Z} .

\mathcal{E} est un sous espace vectoriel de $\mathbb{R}^{\mathbb{Z}}$ car :

- la fonction nulle est harmonique puisqu'elle vérifie (3)
- Soit $f, g \in \mathcal{E}$ et $\lambda \in \mathbb{R}$ alors pour tout $k \in \mathbb{Z}$, on a :

$$\begin{aligned} (\lambda f + g)(k+2) &= \lambda f(k+2) + g(k+2) \\ &= \lambda(2f(k+1) - f(k)) + 2g(k+1) - g(k) \\ &= 2(\lambda f + g)(k+1) - (\lambda f + g)(k) \end{aligned}$$

Ce qui prouve que $\lambda f + g \in \mathcal{E}$

Dimension de \mathcal{E} :

Soit $f \in \mathcal{E}$ alors pour tout $k \in \mathbb{Z}$, on a :

$$f(k+2) - f(k+1) = f(k+1) - f(k)$$

donc l'application

$$k \mapsto f(k+1) - f(k)$$

est constante de valeur $a = f(1) - f(0)$ de sorte que

$$\forall k \in \mathbb{Z}, \quad f(k+1) - f(k) = a$$

Si p, q sont deux entiers relatifs tel que $p \leq q$, on a en sommant de p à q :

$$\sum_{k=p}^q f(k+1) - f(k) = ((q-p)+1)a = f(q+1) - f(p).$$

En particulier si $n \in \mathbb{N}^*$, pour $(p, q) = (0, n-1)$ il vient :

$$f(n) = f(0) + an$$

et pour $(p, q) = (-n, -1)$ il vient :

$$f(0) - f(-n) = -na,$$

donc

$$\forall k \in \mathbb{Z}^*, f(k) = ak + f(0)$$

Égalité valable si $k = 0$ donc finalement :

$$\forall k \in \mathbb{Z}, f(k) = ak + b, \text{ avec } \begin{cases} a = f(1) - f(0) \\ b = f(0) \end{cases} .$$

Pour tout $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, notons $f_{a,b}$ l'application de \mathbb{Z} vers \mathbb{R} définie par $\forall k \in \mathbb{Z}, f_{a,b}(k) = ak + b$. Réciproquement, pour tout $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, l'application $f_{a,b}$ vérifie : $f_{a,b}(k+2) - 2f_{a,b}(k+1) + f_{a,b}(k) = 0$, pour tout $k \in \mathbb{Z}$, donc $f_{a,b} \in \mathcal{E}$. Ainsi, on a montré que :

$$\mathcal{E} = \{f_{a,b}/(a, b) \in \mathbb{R}^2\}$$

Remarquons que pour tout $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, on a $f_{a,b} = af_{1,0} + bf_{0,1}$, de sorte que la famille $\mathcal{B} = (f_{1,0}, f_{0,1})$ est une famille génératrice de \mathcal{E} .

Par ailleurs, la famille \mathcal{B} est libre car si $\lambda f_{1,0} + \mu f_{0,1} = 0$ ($\lambda, \mu \in \mathbb{R}$) alors en appliquant à 0 et 1 on obtient $\lambda = \mu = 0$. Il en découle que \mathcal{B} est une base de \mathcal{E} et que par conséquent, $\dim \mathcal{E} = 2$.

4.3. On a, pour tout $k \in \mathbb{Z}^*$, $k \in I(\mathbb{Z}^*) \Leftrightarrow V(k) \subset \mathbb{Z}^*$, or $V(k) = \{k-1, k+1\}$, il en découle que

$$I(\mathbb{Z}^*) = \mathbb{Z}^* \setminus \{-1, 1\} = \mathbb{Z} \setminus \{-1, 0, 1\}.$$

Notons \mathcal{E}' l'ensemble des fonctions $f : \mathbb{Z}^* \rightarrow \mathbb{R}$ harmoniques sur $I(\mathbb{Z}^*)$. Une application $f : \mathbb{Z}^* \rightarrow \mathbb{R}$ est harmonique sur $I(\mathbb{Z}^*)$ si et seulement si :

$$\forall n \in \mathbb{N}^* \quad \begin{cases} f(n+2) = 2f(n+1) + f(n) \\ f(-n-2) = 2f(-n-1) - f(-n) \end{cases}$$

Comme à la question précédente, on a :

$$\exists (a, b, a', b') \in \mathbb{R}^4, \forall k \in \mathbb{Z}^* \quad f(k) = \begin{cases} ak + b & \text{si } k \geq 1 \\ a'k + b' & \text{si } k \leq -1 \end{cases} \quad (4)$$

Réciproquement, une application $f : \mathbb{Z}^* \rightarrow \mathbb{R}$ définie selon (4) ci-dessus est harmonique sur $I(\mathbb{Z}^*)$ (en effet les restrictions respectives à \mathbb{Z}_+^* et \mathbb{Z}_-^* coïncident avec les restrictions d'applications harmoniques sur \mathbb{Z} .)

Notons $f_{a,b,a',b'}$ la fonction définie selon (4). On voit que :

$$f_{a,b,a',b'} = af_{(1,0,0,0)} + bf_{(0,1,0,0)} + a'f_{(0,0,1,0)} + b'f_{(0,0,0,1)}$$

De sorte que $\mathcal{F} = (f_{(1,0,0,0)}, f_{(0,1,0,0)}, f_{(0,0,1,0)}, f_{(0,0,0,1)})$ est une famille génératrice de \mathcal{E}' . La famille \mathcal{F} est libre car si pour $\alpha, \beta, \alpha', \beta' \in \mathbb{R}$, on a :

$$\alpha f_{(1,0,0,0)} + \beta f_{(0,1,0,0)} + \alpha' f_{(0,0,1,0)} + \beta' f_{(0,0,0,1)} = 0$$

alors $\forall k \in \mathbb{N}^*, \alpha k + \beta = 0$ ce qui donne $\alpha = \beta = 0$ et $\forall k \in \mathbb{N}^*, -\alpha' k + \beta' = 0$ ce qui donne $\alpha' = \beta' = 0$.

Il en découle que \mathcal{F} est une base de \mathcal{E}' et que $\dim \mathcal{E}' = 4$.

4.4.

4.4.1. Pour tout $\ell \in V(k)$, on a :

$$\begin{aligned} f(\ell) &\leq \sum_{i \in V(k)} f(i) \quad (\text{car } f \geq 0) \\ &\leq 2df(k) \quad (\text{car } f \text{ est harmonique}) \end{aligned}$$

4.4.2. On va raisonner par récurrence sur $n = \|k - \ell\|_1$

Démarrage : Si $n = 0$ alors $\ell = k$ et la relation demandée est vérifiée (on a même une égalité).

Hérédité : Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que la propriété à prouver est vraie pour n . Soit $\ell, k \in \mathbb{Z}^d$ tel que

$$\|\ell - k\|_1 = n + 1 \quad (\star).$$

Posons $\ell = (\ell_i)_{1 \leq i \leq d}$ et $k = (k_i)_{1 \leq i \leq d}$, donc $\|\ell - k\|_1 = \sum_{i=1}^d |\ell_i - k_i|$. Comme $\|\ell - k\|_1 = n + 1 \geq 1$ il existe $j \in \llbracket 1, d \rrbracket$ tel que $|\ell_j - k_j| \geq 1$.

Considérons $\ell' = \ell - \text{sign}(\ell_j - k_j)e[j]$. Ainsi si on pose $\ell' = (\ell'_i)_{1 \leq i \leq d}$ alors pour tout $i \in \llbracket 1, d \rrbracket$, on a :

$$a : \ell'_i = \begin{cases} \ell_i & \text{si } i \neq j \\ \ell_j - \text{sign}(\ell_j - k_j) & \text{si } i = j \end{cases} .$$

On a $\|\ell' - k\|_1 = n$, en effet :

$$\|\ell' - k\|_1 = |\ell'_j - k_j| + \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq j}}^d |\ell_i - k_i|.$$

(On convient que la somme : $\sum_{\substack{i=1 \\ i \neq j}}^d |\ell_i - k_i|$ vaut 0 dans le cas particulier de $d = 1$).

Remarquons que, compte tenu de $\forall t \in \mathbb{Z}^*, t = \text{sign}(t)|t|$ et du fait que $|\ell_j - k_j| \geq 1$:

$$\begin{aligned} |\ell'_j - k_j| &= |\ell_j - k_j - \text{sign}(\ell_j - k_j)| \\ &= |\text{sign}(\ell_j - k_j)(|\ell_j - k_j| - 1)| \\ &= |\ell_j - k_j| - 1. \end{aligned}$$

Il en découle que $\|\ell' - k\|_1 = \|\ell - k\|_1 - 1 = (n + 1) - 1 = n$.

Il est aisé de remarquer aussi que $\|\ell' - \ell\|_1 = 1$.

En appliquant l'hypothèse de récurrence, on a :

$$f(\ell') \leq (2d)^{\|\ell' - k\|_1} f(k) \quad (**)$$

Puisque $\|\ell - \ell'\|_1 = 1$, donc d'après la question précédente, on a :

$$f(\ell) \leq 2df(\ell') \quad (***)$$

Combinant (**) et (***) il vient :

$$f(\ell) \leq (2d)^{\|\ell' - k\|_1 + 1} f(k)$$

et comme $\|\ell' - k\|_1 + 1 = \|\ell - k\|_1$, on a finalement :

$$f(\ell) \leq (2d)^{\|\ell - k\|_1} f(k)$$

4.4.3. Si on suppose qu'il existe $k \in \mathbb{Z}^d$ tel que $f(k) = 0$, alors en appliquant le résultat de la question précédente, on a :

$$\forall \ell \in \mathbb{Z}^d, \quad f(\ell) \leq 0$$

Comme, en plus f est supposée positive, on a $f(\ell) = 0, \forall \ell \in \mathbb{Z}^d$, ce qui prouve que $f = 0$.

4.4.4. Supposons que f n'est pas nulle, alors d'après la question ci-dessus, on a $\forall k \in \mathbb{Z}^d, f(k) > 0$. Appliquant la question **4.4.2.** on a pour $k, \ell \in \mathbb{Z}^d$:

$$(1) \quad \ln(f(\ell)) \leq \|\ell - k\|_1 \ln(2d) + \ln(f(k))$$

ce qui fournit :

$$(2) \quad \ln(f(\ell)) - \ln(f(k)) \leq \|\ell - k\|_1 \ln(2d)$$

Par symétrie des rôles, on a aussi :

$$(2)' \quad \ln(f(\ell)) - \ln(f(k)) \leq \|\ell - k\|_1 \ln(2d)$$

Il en découle que :

$$|\ln(f(\ell)) - \ln(f(k))| \leq \|\ell - k\|_1 \ln(2d)$$

Partie II : Un résultat de LIOUVILLE dans le cadre discret

5.1. On se donne une application $g : \mathbb{Z}^d \rightarrow \mathbb{R}$ tel que :

$$\exists(a, b) \in [0, +\infty[^2, \forall k \in \mathbb{Z}^d, |g(k)| \leq \exp(a\|k\|_1 + b). \quad (5)$$

5.1.1. Montrons que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad |g(Y_n)| \leq \exp(an + b) \quad (6)$$

La variable aléatoire Y_n étant à valeurs dans \mathbb{Z}^d , on a en vertu de (5) :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad |g(Y_n)| \leq \exp(a\|Y_n\|_1 + b)$$

Donc, pour avoir (6), il suffit qu'on montre que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \|Y_n\|_1 \leq n \quad (7)$$

On a pour tout $i \in \mathbb{N}$:

$$Y_{i+1} - Y_i = \text{sign}(X_i)e[|X_i|]$$

On suppose que $n \geq 1$. Par sommation de 0 à $n - 1$, et compte tenu de $Y_0 = 0$, on obtient :

$$Y_n = \sum_{i=0}^{n-1} \text{sign}(X_i)e[|X_i|]$$

Comme sign est à valeurs dans $\{-1, 1\}$ et que les vecteurs $e[|X_i|]$ sont tous de norme 1, on a par l'inégalité triangulaire : $\|Y_n\|_1 \leq n$; inégalité valable si $n = 0$; ce qui achève la preuve.

5.1.2. Puisque $U(\Omega) = \mathbb{N}$, on a d'après la question précédente :

$$|g(Y_U)| \leq \exp(aU + b) \quad (8)$$

Considérons la variable aléatoire réelle $V = \exp(aU + b)$. Puisque U admet une espérance, alors par le théorème de transfert appliqué à la fonction $t \mapsto \exp(at + b)$, il suffit que la série :

$$\sum \mathbb{P}(U = n) \exp(an + b)$$

converge absolument pour que V admette une espérance, auquel cas $\mathbb{E}(V)$ est la somme de cette série. Or le terme général de la série en question est $V_n = \exp(-\lambda) \frac{\lambda^n}{n!} \exp(an + b)$, donc $V_n = \exp(b - \lambda) \frac{(\lambda e^a)^n}{n!}$ de sorte que $V_n \geq 0$ et $\sum_{n=0}^{+\infty} V_n = \exp(b - \lambda) \exp(\lambda e^a) = \exp(b + \lambda(e^a - 1))$, donc V admet une espérance et $\mathbb{E}(V) = \exp(b + \lambda(e^a - 1))$. En vertu de (8) ci-dessus, on déduit que la variable aléatoire réelle $|g(Y_U)|$ admet une espérance et que :

$$\mathbb{E}(|g(Y_U)|) \leq \exp(b + \lambda(e^a - 1)).$$

5.1.3. • L'existence de l'espérance de la variable aléatoire $g(Y_U)^2$:

De l'inégalité (8) ci-dessus, on déduit aussi :

$$0 \leq g(Y_U)^2 \leq \exp(2aU + 2b) \quad (9)$$

En posant $a' = 2a$ et $b' = 2b$, le procédé utilisé ci-dessus permet de déduire que la variable aléatoire $g(Y_U)^2$ admet une espérance avec une majoration similaire en remplaçant a et b par $2a$ et $2b$ respectivement.

• Par le théorème de transfert appliqué à la variable aléatoire $g(Y_U)$ et l'application $t \mapsto t^2$, on a, en notant $D = g(Y_U)(\Omega)$:

$$\mathbb{E}(g(Y_U)^2) = \sum_{x \in D} x^2 \mathbb{P}(g(Y_U) = x)$$

Soit $\omega \in \Omega$, alors :

$$\begin{aligned} \omega \in (g(Y_U) = x) &\Leftrightarrow g(Y_U(\omega)) = x \\ &\Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{Z}^d, Y_U(\omega) = k \text{ et } g(k) = x \\ &\Leftrightarrow \exists k \in Z_x, \omega \in (Y_U = k) \end{aligned}$$

où pour tout $x \in D$, on pose $Z_x = \{k \in \mathbb{Z}^d / g(k) = x\}$. Ainsi on a prouvé que

$$(g(Y_U) = x) = \bigcup_{k \in Z_x} (Y_U = k).$$

Comme il s'agit d'une union dénombrable disjointe, on a alors :

$$\mathbb{E}(g(Y_U)^2) = \sum_{x \in D} \sum_{k \in Z_x} g(k)^2 \mathbb{P}(Y_U = k)$$

Si on note $Z = \bigcup_{x \in D} Z_x$ alors $(Z_x)_{x \in D}$ est une partition de Z . En effet :

- Pour tout $x \in D$ on a $Z_x \neq \emptyset$ car comme $x \in D$ il existe $\omega \in \Omega$ tel que $g(Y_U)(\omega) = x$. Posons $k = Y_U(\omega)$ alors $k \in \mathbb{Z}^d$ et $g(k) = x$, ce qui veut dire $k \in Z_x$, donc $Z_x \neq \emptyset$.
- Si $x, y \in D$ tel que $Z_x \cap Z_y \neq \emptyset$, soit $k \in Z_x \cap Z_y$ alors $x = g(k)$ et $y = g(k)$, donc $x = y$.
- Finalement on a $\bigcup_{x \in D} Z_x = Z$ par définition de Z .

Comme nous avons une famille sommable de nombres réels positifs, on peut appliquer les principes de sommation par paquets, notamment on a :

- (i) Pour tout $x \in D$ la famille $(g(k)^2 \mathbb{P}(Y_U = k))_{k \in Z_x}$ est sommable.
- (ii) Si on note s_x sa somme alors la famille $(s_x)_{x \in D}$ est sommable.
- (iii) On a : $\sum_{x \in D} s_x = \sum_{k \in Z} g(k)^2 \mathbb{P}(Y_U = k)$.

Cela veut dire :

$$\mathbb{E}(g(Y_U)^2) = \sum_{k \in Z} g(k)^2 \mathbb{P}(Y_U = k)$$

On va montrer que si $\mathbb{P}(Y_U = k) \neq 0$; ($k \in \mathbb{Z}^d$), alors $k \in Z$. En effet, si $\mathbb{P}(Y_U = k) \neq 0$ alors forcément $(Y_U = k) \neq \emptyset$. Soit alors $\omega \in \Omega$ tel que $Y_U(\omega) = k$ et soit $x = g(k)$. Alors $k \in Z_x$, et comme $Z_x \subset Z$, on a $k \in Z$.

Il en résulte que $\mathbb{P}(Y_U = k) = 0, \forall k \in \mathbb{Z}^d \setminus Z$, par suite :

$$\mathbb{E}(g(Y_U)^2) = \sum_{k \in \mathbb{Z}^d} g(k)^2 \mathbb{P}(Y_U = k)$$

5.2. On considère $f : \mathbb{Z}^d \rightarrow \mathbb{R}_+$, harmonique sur \mathbb{Z}^d et vérifiant $f(0) = 1$. On rappelle que

$$\forall k \in \mathbb{Z}^d, \quad f(k) \leq (2d)^{\|k\|_1}$$

2. En fait on peut démontrer même que :

$$\forall k \in \mathbb{Z}^d \quad \mathbb{P}(Y_U = k) > 0$$

c'est-à-dire que $Z = \mathbb{Z}^d$

5.2.1. Soit $j \in \mathbb{N}$, On a $Y_j(\Omega)$ est une partie finie de \mathbb{Z}^d . On va démontrer cela par récurrence : Pour $j = 0$ on a $Y_0(\Omega) = \{0\}$, donc c'est clair.

Si pour $j \in \mathbb{N}$ l'ensemble $Y_j(\Omega)$ est fini comme $Y_{j+1} = Y_j + \text{sign}(X_j)e[|X_j|]$ et que pour tout $\omega \in \Omega$, on a $\text{sign}(X_j)(\omega) \in \{-1, 1\}$ et $e[|X_j(\omega)|] \in \{e_1, \dots, e_d\}$, alors $\text{sign}(X_j)e[|X_j|](\Omega)$ est fini. Et comme $Y_j(\Omega)$ est par hypothèse fini, alors $Y_{j+1}(\Omega)$ est fini, ce qui termine la preuve.

Ainsi l'ensemble des valeurs possibles de la variable aléatoire Y_j est fini, donc de même pour la variable aléatoire $f(Y_j)$ et elle admet par suite les moments de tout ordre, notamment le moment d'ordre 2.

Remarquons que l'inégalité $f(k) \leq (2d)^{\|k\|_1}$ s'écrit (puisque $f \geq 0$) : $|f(k)| \leq \exp(a\|k\|_1 + b)$ avec $a = \ln(2d)$ et $b = 0$, ce qui permet de dire que f satisfait la condition de la question précédente pour g . On peut donc appliquer les résultat de la question **5.1.3.**, donc : la variable aléatoire $f(Y_U)$ admet un moment d'ordre 2 et :

$$\mathbb{E}(f(Y_U)^2) = \sum_{k \in \mathbb{Z}^d} f(k)^2 \mathbb{P}(Y_U = k)$$

Remarquons que pour tout $\omega \in \Omega$, on a

$$\begin{aligned} \omega \in (Y_U = k) &\Leftrightarrow \exists n \in \mathbb{N}, U(\omega) = n \quad \text{et} \quad Y_n(\omega) = k \\ &\Leftrightarrow \exists n \in \mathbb{N}, \omega \in ((U = n) \cap (Y_n = k)) \\ &\Leftrightarrow \omega \in \bigcup_{n \in \mathbb{N}} ((U = n) \cap (Y_n = k)) \end{aligned}$$

Donc

$$\forall k \in \mathbb{Z}^d, \quad (Y_U = k) = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} ((U = n) \cap (Y_n = k))$$

Compte tenu de l'indépendance des Y_n et U supposée par l'énoncé et du fait que la réunion ci-dessus est disjointe, on a alors :

$$\forall k \in \mathbb{Z}^d, \quad \mathbb{P}(Y_U = k) = \sum_{n=0}^{+\infty} \mathbb{P}(U = n) \mathbb{P}(Y_n = k) = e^{-\lambda} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\lambda^n}{n!} \mathbb{P}(Y_n = k)$$

et par suite et par interversion des signes de sommation validé par la sommabilité de la famille en question, on a :

$$\mathbb{E}(f(Y_U)^2) = e^{-\lambda} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\lambda^n}{n!} \sum_{k \in \mathbb{Z}^d} f(k)^2 \mathbb{P}(Y_n = k) = e^{-\lambda} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\lambda^n}{n!} \mathbb{E}(f(Y_n)^2).$$

Par la même méthode utilisée dans **5.1.3.** on peut prouver que :

$$\mathbb{E}(f(Y_U)) = \sum_{k \in \mathbb{Z}^d} f(k) \mathbb{P}(Y_U = k)$$

On obtient alors la formule demandée en utilisant aussi la même méthode que celle pour prouvée la formule donnant $\mathbb{E}(f(Y_U)^2)$.

5.2.2. Soit $n \in \mathbb{N}$. On sait que $Y_{n+1} = Y_n + \text{sign}(X_n)e[|X_n|]$

On a

$$\mathbb{E}(f(Y_{n+1})) = \sum_{k \in \mathbb{Z}^d} f(k) \mathbb{P}(Y_{n+1} = k)$$

Notons qu'il s'agit d'une somme finie car $\forall p \in \mathbb{N}$, $Y_p(\Omega)$ est fini.

Or, par la formule des probabilités totales, on a :

$$\mathbb{P}(Y_{n+1} = k) = \sum_{\ell \in \mathbb{Z}^d} \mathbb{P}(Y_n = \ell) \pi_{k,\ell}$$

avec

$$\pi_{k,\ell} = \begin{cases} 0 & \text{si } \mathbb{P}(Y_n = \ell) = 0 \\ \mathbb{P}(Y_{n+1} = k) / \mathbb{P}(Y_n = \ell) & \text{si } \mathbb{P}(Y_n = \ell) \neq 0 \end{cases}$$

Ainsi

$$\mathbb{E}(f(Y_{n+1})) = \sum_{k \in \mathbb{Z}^d} \sum_{\ell \in \mathbb{Z}^d} f(k) \mathbb{P}(Y_n = \ell) \pi_{k,\ell}$$

La famille $(\mathbb{P}(Y_n = \ell) \pi_{k,\ell})_{(k,\ell) \in \mathbb{Z}^d \times \mathbb{Z}^d}$ est à support finie, ce qui permet en particulier de permuter les deux symboles de sommation et obtenir :

$$\mathbb{E}(f(Y_{n+1})) = \sum_{\ell \in \mathbb{Z}^d} \sum_{k \in \mathbb{Z}^d} f(k) \mathbb{P}(Y_n = \ell) \pi_{k,\ell}$$

Soit $\ell \in \mathbb{Z}^d$, alors deux cas sont possibles et dans chacun des cas, on va prouver que :

$$\sum_{k \in \mathbb{Z}^d} f(k) \mathbb{P}(Y_n = \ell) \pi_{k,\ell} = f(\ell) \mathbb{P}(Y_n = \ell) \quad (10)$$

• **Premier cas** : $\mathbb{P}(Y_n = \ell) = 0$, dans ce cas la relation (10) est clairement réalisée.

• **Deuxième cas** : $\mathbb{P}(Y_n = \ell) \neq 0$, dans ce cas, on a : $\pi_{k,\ell} = \mathbb{P}(Y_{n+1} = k / Y_n = \ell)$. Or par définition de la suite on a $\|Y_{n+1} - Y_n\|_1 = 1$, donc la probabilité conditionnelle $\mathbb{P}(Y_{n+1} = k / Y_n = \ell)$ est nulle dès que $k \notin V(\ell)$, et comme l'application $\chi_\ell : i \mapsto \text{sign}(i) X_{|i|}$ est une bijection de $D_d = \llbracket -d, d \rrbracket \setminus \{0\}$ vers $V(\ell)$, la valeur de cette probabilité conditionnelle, pour tout $k \in V(\ell)$ est :

$$\mathbb{P}(Y_{n+1} = k / Y_n = \ell) = \frac{1}{2d}$$

Ainsi,

$$\sum_{k \in \mathbb{Z}^d} f(k) \mathbb{P}(Y_n = \ell) \pi_{k,\ell} = \left(\frac{1}{2d} \sum_{k \in V(\ell)} f(k) \right) \mathbb{P}(Y_n = \ell)$$

et comme f est harmonique, on a : $\frac{1}{2d} \sum_{k \in V(\ell)} f(k) = f(\ell)$, ce qui prouve la relation (10).

On a alors :

$$\mathbb{E}(f(Y_{n+1})) = \sum_{\ell \in \mathbb{Z}^d} f(\ell) \mathbb{P}(Y_n = \ell) = \mathbb{E}(f(Y_n)).$$

Ainsi la suite $(\mathbb{E}(f(Y_n)))_{n \in \mathbb{N}}$ est constante, donc :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \mathbb{E}(f(Y_n)) = \mathbb{E}(f(Y_0)) = \mathbb{E}(f(0)) = f(0) = 1$$

Déduction : On a d'après 5.2.1 :

$$\mathbb{E}(f(Y_U)) = e^{-\lambda} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\lambda^n}{n!} \mathbb{E}(f(Y_n)).$$

Compte tenu de $\mathbb{E}(f(Y_n)) = 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a :

$$\mathbb{E}(f(Y_U)) = e^{-\lambda} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\lambda^n}{n!} = e^{-\lambda} e^\lambda = 1.$$

5.3. i) Montrons que H est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^{\mathbb{Z}^d}$:

- D'abord $0 \in H$, donc $H \neq \emptyset$.

- Soit $f_1, f_2 \in H$ et $\lambda \in \mathbb{R}$: Le seule point à vérifier est l'existence de $\mathbb{E}((\lambda f_1 + f_2)(Y_U))^2$, pour cela remarquons que pour tout $x, y \in \mathbb{R}$ on a : $0 \leq (x + y)^2 \leq 2(x^2 + y^2)$, donc :

$$0 \leq ((\lambda f_1 + f_2)(Y_U))^2 \leq 2\lambda^2(f_1(Y_U))^2 + 2(f_2(Y_U))^2$$

ce qui prouve que $\lambda f_1 + f_2 \in H$.

ii) S est un produit scalaire :

• Existence : Soit $f_1, f_2 \in H$. Pour tout $x, y \in \mathbb{R}$, on a : $|xy| \leq x^2 + y^2$, donc $|f_1(Y_U)f_2(Y_U)| \leq f_1(Y_U)^2 + f_2(Y_U)^2$ et comme $\mathbb{E}(f_i(Y_U)^2)$ existent pour $i \in \{1, 2\}$ (car $f_i \in H$), il en découle que S est bien définie.

• Symétrie de S : C'est immédiat par commutativité de la multiplication dans \mathbb{R} .

• Linéarité à droite :

Soit $f, g_1, g_2 \in H$ et $\lambda \in \mathbb{R}$, alors :

$$\begin{aligned} S(f, \lambda g_1 + g_2) &= \mathbb{E}(f(Y_U)(\lambda g_1 + g_2)(Y_U)) \\ &= \mathbb{E}(\lambda f(Y_U)g_1(Y_U) + f(Y_U)g_2(Y_U)) \\ &= \lambda \mathbb{E}(f(Y_U)g_1(Y_U)) + \mathbb{E}(f(Y_U)g_2(Y_U)) \quad (\text{linéarité de l'espérance}) \\ &= \lambda S(f, g_1) + S(f, g_2) \end{aligned}$$

• S est positive : Clair

• S est définie :

Soit $f \in H$ tel que $S(f, f) = 0$, alors $\mathbb{E}(f(Y_U)^2) = 0$. Or d'après la méthode utilisée dans la question **5.1.3**, on a $\sum_{k \in \mathbb{Z}^d} f(k)^2 \mathbb{P}(Y_U = k) = 0$ et comme il s'agit d'une somme à termes positifs, on a $\forall k \in \mathbb{Z}^d, f(k)^2 \mathbb{P}(Y_U = k) = 0$. On va prouver que :

$$\forall k \in \mathbb{Z}^d, \mathbb{P}(Y_U = k) \neq 0$$

ce qui permettra de conclure que $f = 0$.

On a

$$(Y_U = k) = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} ((U = n) \cap (Y_n = k))$$

donc, on a en particulier :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \mathbb{P}(Y_U = k) \geq \mathbb{P}((U = n) \cap (Y_n = k))$$

Les variables aléatoires Y_n et U sont indépendantes et $\mathbb{P}(U = n) > 0$, donc on est ramené à démontrer que :

$$\forall k \in \mathbb{Z}^d, \exists n \in \mathbb{N}, \mathbb{P}(Y_n = k) > 0$$

On va prouver ça en raisonnant par récurrence sur $q = \|k\|_1$.

Démontrons par récurrence sur $q \in \mathbb{N}$ la propriété $\mathcal{P}(q)$ suivante :

$$\mathcal{P}(q) : \quad \forall k \in \mathbb{Z}^d, \|k\|_1 = q \Rightarrow \exists n \in \mathbb{N}, \mathbb{P}(Y_n = k) > 0$$

• **Démarrage** : Pour $q = 0$, si $k \in \mathbb{Z}^d$ tel que $\|k\|_1 = 0$, cela veut dire que $k = 0$ et comme $Y_0 = 0$, alors $n = 0$ convient.

• **Hérédité** : Soit $q \in \mathbb{N}$ tel que $\mathcal{P}(q)$ est vraie et soit $k \in \mathbb{Z}^d$ tel que $\|k\|_1 = q + 1$. Comme on

l'a fait dans la question **4.4.2**, on sait qu'il existe $j \in \llbracket 1, d \rrbracket$ et $\varepsilon_j \in \{-1, 1\}$ tel que $k' = k + \varepsilon_j e[j]$ réalise $\|k'\|_1 = q$. Par hypothèse de récurrence, il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $\mathbb{P}(Y_n = k') > 0$. On a :

$$\mathbb{P}(Y_{n+1} = k) \geq \mathbb{P}((Y_{n+1} = k) \cap (Y_n = k')) = \mathbb{P}(Y_{n+1} = k / Y_n = k') \mathbb{P}(Y_n = k')$$

On a déjà prouvé dans la question **5.2.2** que la probabilité conditionnelle $\mathbb{P}(Y_{n+1} = k / Y_n = k') \mathbb{P}(Y_n = k')$ vaut $\frac{1}{2d}$ (l'important est qu'elle soit non nulle). Donc $\mathbb{P}(Y_{n+1} = k) = \frac{1}{2d} \mathbb{P}(Y_n = k') > 0$.

5.4.

5.4.1. • f_i est bien définie. En effet, on a $\|m\|_2 = \max_{f \in E} \|f\|_2$ et $\mathbb{1} \in E$, donc $\|m\|_2 \geq \|\mathbb{1}\|_2 > 0$. Ainsi, $m \neq 0$; comme $m \geq 0$ et m harmonique alors d'après **4.4.3**, on déduit que $\forall k \in \mathbb{Z}^d, m(k) > 0$. Ce résultat sera utile par la suite, en particulier $\forall k \in \mathbb{Z}^d, m(k) \neq 0$. Donc f_i est bien définie sur \mathbb{Z}^d .

• f_i est harmonique sur \mathbb{Z}^d .

En effet : Comme $f = \alpha_i \tilde{m}$ avec

$$\begin{cases} \alpha_i = \frac{1}{m(\text{sign}(i)e[|i|])} \\ \forall k \in \mathbb{Z}^d, \tilde{m}(k) = m(k + \text{sign}(i)e[|i|]) \end{cases}$$

Il est aisé de voir que l'ensemble des fonctions harmoniques sur \mathbb{Z}^d est stable par combinaison linéaire, il suffit donc de prouver que \tilde{m} est harmonique sur \mathbb{Z}^d .

Soit pour cela $k \in I(\mathbb{Z}^d) = \mathbb{Z}^d$, alors en adoptant la notation $k' = k + \text{sign}(i)e[|i|]$, on a :

$$\sum_{\ell \in V(k)} \tilde{m}(\ell) = \sum_{\ell \in V(k)} m(\ell + \text{sign}(i)e[|i|]) = \sum_{\ell' \in V(k')} m(\ell')$$

La dernière égalité étant justifiée par le fait que l'application

$$V(k) \rightarrow V(k'); \ell \mapsto \ell' = \ell + \text{sign}(i)e[|i|]$$

est une bijection.

. Puisque m est supposée harmonique, on a donc :

$$\sum_{\ell \in V(k)} \tilde{m}(\ell) = (2d) m(k') = (2d) \tilde{m}(k)$$

ce qui prouve que \tilde{m} est harmonique.

Conclusion : f_i est harmonique.

• f_i déjà fait puisqu'on a prouvé que $m > 0$.

• $f_i(0) = 1$: clair en remplaçant x par 0.

5.4.2. $D_d = \{-d, \dots, -1, 1, \dots, d\}$. pour tout $i \in D_d$, posons

$$\lambda_i = \frac{m(\text{sign}(i)e[|i|])}{2d}$$

Alors on a ce qui suit :

• Pour tout $i \in D_d$, on a $\lambda_i > 0$; en effet pour tout $\ell \in \mathbb{Z}^d$, on a $m(\ell) > 0$ et $d > 0$.

• $\sum_{i \in D_d} \lambda_i = 1$; en effet les éléments de la forme $\text{sign}(i)e[|i|]$ quand i décrit D_d , ne sont autre que les

éléments de $V(0)$. Compte tenu de cette remarque et le fait que m est harmonique, on a :

$$\sum_{i \in D_d} \lambda_i = \frac{1}{2d} \sum_{\ell \in V(0)} m(\ell) = m(0) = 1$$

- $\sum_{i \in D_d} \lambda_i f_i = m$, en effet, pour tout $x \in \mathbb{Z}^d$, et $i \in D_d$, on sait que :

$$f_i(x) = \frac{m(x + \text{sign}(i)e[|i|])}{m(\text{sign}(i)e[|i|])}$$

Il en résulte que :

$$\sum_{i \in D_d} \lambda_i f_i(x) = \frac{1}{2d} \sum_{i \in D_d} m(x + \text{sign}(i)e[|i|]) = \frac{1}{2d} \sum_{\ell \in V(x)} m(\ell) = m(x)$$

La dernière égalité étant justifiée par le fait que m est harmonique et l'avant dernière, tout comme ci-dessus car les éléments de la forme $x + \text{sign}(i)e[|i|]$ quand i décrit D_d , ne sont autre que les éléments de $V(x)$.

Conclusion : On a montré qu'il existe une famille $(\lambda_i)_{i \in D_d}$ de nombre réels positifs de somme 1 tel que $m = \sum_{i \in D_d} \lambda_i f_i$, ce qui justifie que m est un combinaison linéaire convexe des f_i .

5.4.3. Montrons que $\forall i \in D_d, \forall x \in \mathbb{Z}^d, m(x) = f_i(x)$ On a

$$\begin{aligned} 0 \leq \sum_{i \in D_d} \lambda_i \|f_i - m\|_2^2 &= \sum_{i \in D_d} \lambda_i (\|f_i\|_2^2 - 2\langle f_i, m \rangle + \|m\|_2^2) \\ &= \sum_{i \in D_d} \lambda_i \|f_i\|_2^2 - 2 \left\langle \sum_{i \in D_d} \lambda_i f_i, m \right\rangle + \left(\sum_{i \in D_d} \lambda_i \right) \|m\|_2^2 \\ &= \sum_{i \in D_d} \lambda_i \|f_i\|_2^2 - 2\langle m, m \rangle + \|m\|_2^2, \text{ (car } \sum_{i \in D_d} f_i = m \text{ et } \sum_{i \in D_d} \lambda_i = 1) \\ &= \sum_{i \in D_d} \lambda_i \|f_i\|_2^2 - \|m\|_2^2 \end{aligned}$$

Or, pour tout $i \in D_d$, on a $f_i \in E$ car f_i est harmonique et $f_i \geq 0$ et $f_i(0) = 1$.

Comme $\|m\|_2 = \max_{f \in E} \|f\|_2$, on a :

$$\forall i \in D_d, \|f_i\|_2 \leq \|m\|_2$$

Donc

$$\sum_{i \in D_d} \lambda_i \|f_i\|_2^2 - \|m\|_2^2 \leq \sum_{i \in D_d} \lambda_i \|m\|_2^2 - \|m\|_2^2 = 0$$

ce qui prouve que :

$$0 \leq \sum_{i \in D_d} \lambda_i \|f_i - m\|_2^2 \leq 0$$

donc que :

$$\sum_{i \in D_d} \lambda_i \|f_i - m\|_2^2 = 0$$

Comme il s'agit d'une somme à termes positifs et qu'en plus $\lambda_i > 0, \forall i \in D_d$, on a $\forall i \in D_d, f_i = m$

Conclusion : $\forall i \in D_d, \forall k \in \mathbb{Z}^d, f_i(k) = m(k)$.

• Pour tout $i \in D_d$, posons $u_i = \text{sign}(i)e[|i|]$.

Pour tout $i \in \llbracket 1, d \rrbracket$, on a $m(u_{-i}) = f_i(u_{-i}) = \frac{m(u_{-i} + u_i)}{m(u_i)}$

Comme $u_{-i} + u_i = 0$ et que $m(0) = f_i(0) = 1$, on obtient :

$$(\star\star\star) \quad \forall i \in \llbracket 1, d \rrbracket, m(u_i)m(u_{-i}) = 1$$

On a

$$1 = m(0) = \frac{1}{2d} \sum_{i \in D_d} m(u_i) \quad (\text{car } m \text{ est harmonique sur } \mathbb{Z}^d)$$

On obtient compte tenu de $(\star \star \star)$ ci-dessus :

$$\sum_{i=1}^d \left(m(u_i) + \frac{1}{m(u_i)} \right) = 2d$$

qui s'écrit aussi

$$(\star \star) \quad \sum_{i=1}^d \left(m(u_i) + \frac{1}{m(u_i)} - 2 \right) = 0$$

ou alors :

$$\sum_{i=1}^d \frac{(m(u_i) - 1)^2}{m(u_i)} = 0 \quad (11)$$

Dans (11) on a une somme nulle dont les termes sont positifs, donc ces termes sont tous nuls, d'où : $\forall i \in \llbracket 1, d \rrbracket \quad m(u_i) = 1$, ce qui, compte tenu de $(\star \star \star)$, donne aussi : $\forall i \in \llbracket 1, d \rrbracket \quad m(u_{-i}) = 1$, ce qui donne finalement : $\forall i \in D_d \quad m(u_i) = 1$

Soit $x \in \mathbb{Z}^d$ alors $m(x) = f_i(x) = \frac{m(x+u_i)}{m(u_i)}$ par suite : $m(x + u_i) = m(x)m(u_i) = m(x)$ (car $m(u_i) = 1$), ce qui se traduit aussi par :

$$\forall x \in \mathbb{Z}^d, \forall i \in \llbracket 1, d \rrbracket, \quad m(x + e[i]) = m(x - e[i]) = m(x). \quad (12)$$

On va démontrer par récurrence sur $n = \|x\|_1$ que $m(x) = 1$ pour tout $x \in \mathbb{Z}^d$.

-Pour $n = 0$ c'est clair car $m(0) = 1$.

-Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $m(x) = 1$ pour tout $x \in \mathbb{Z}^d$ tel que $\|x\|_1 = n$. Soit $x \in \mathbb{Z}^d$ tel que $\|x\|_1 = n + 1$.

Posons $x = \sum_{j=1}^d x_j e[j]$, et comme $\|x\|_1 = \sum_{j=1}^d |x_j| = n + 1$ on peut affirmer qu'il existe $i \in \llbracket 1, d \rrbracket$ tel

que $|x_i| \geq 1$. Comme on a fait à la question 4.4.2. , on sait que si on pose $x' = x - \text{sign}(x_i)e[i]$ alors $\|x'\|_1 = n$. On a alors $m(x) = m(x' \pm e[i]) = m(x') = 1$ (on a utilisé la propriété (12) ci-dessus et l'hypothèse de récurrence).

Ceci finit la preuve du fait que m est constante de valeur 1 sur \mathbb{Z}^d .

5.5. • Soit $f : \mathbb{Z}^d \rightarrow \mathbb{R}_+$, harmonique tel que $f(0) = 1$, donc $f \in E$, ainsi :

$$V(f(Y_U)) = \mathbb{E}(f(Y_U)^2) - \mathbb{E}(f(Y_U))^2 = \mathbb{E}(f(Y_U)^2) - 1$$

car $\mathbb{E}(f(Y_U)) = 1$ d'après la question **5.2.2.**

Par ailleurs, on a : $\mathbb{E}(f(Y_U)^2) = \|f\|_2^2 \leq \|m\|_2 = \mathbb{E}(m(Y_U)^2)$, donc : $V(f(Y_U)) \leq \mathbb{E}(m(Y_U)^2) - 1$.

• Comme m est constante de valeur 1, on a $\mathbb{E}(m(Y_U)^2) = 1$ donc $V(f(Y_U)) \leq 0$ et par suite $V(f(Y_U)) = 0$. En posant $\mu_0 = \mathbb{E}(f(Y_U))$ on a alors : $\mathbb{E}((f(Y_U) - \mu_0)^2) = 0$ donc $\|f - \mu_0\|_2 = 0$ et par suite $f = \mu_0$, donc f est constante de valeur μ_0 .

5.6. Démonstration du résultat de Liouville :

Soit $f : \mathbb{Z}^d \rightarrow \mathbb{R}$ une application.

- **Premier cas :** Si f est harmonique positive et tel que $f(0) = 1$ alors d'après ce qui précède, f est constante.

- **Deuxième cas :** Si f est harmonique minorée, on a f est minorée, donc

$$\exists a \in \mathbb{R}, \forall k \in \mathbb{Z}^d, a < f(k)$$

Posons $F = \frac{f-a}{f(0)-a}$

• On a $F = \alpha f + \beta \mathbb{1}$ avec $\alpha = \frac{1}{f(0)-a}$ et $\beta = \frac{-a}{f(0)-a}$ et $\mathbb{1}$ est l'application constante sur \mathbb{Z}^d de valeur

1, donc F est harmonique sur \mathbb{Z}^d , vue comme combinaison linéaire de fonctions harmoniques sur \mathbb{Z}^d (Il est aisé de prouver qu'une telle combinaison linéaire est harmonique).

• $F \geq 0$: clair.

• $F(0) = 1$: clair.

D'après le premier cas, F est constante sur \mathbb{Z}^d , par suite $f = (f(0) - a)F + a\mathbb{1}$ est constante sur \mathbb{Z}^d .

- **Troisième cas** : Soit $f : \mathbb{Z}^d \rightarrow \mathbb{R}$, harmonique et majorée, alors $(-f)$ est harmonique minorée, donc d'après le deuxième cas ci-dessus, $(-f)$ donc f est constante. Ceci termine la preuve du résultat de Liouville.