Devoir libre n°11
Correction

N'hésitez pas de me signaler les erreurs rencontrées.

Partie 1. Généralités.

1. Pour toute matrice $M = (m_{ij})_{1 \leq i, j \leq n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ à coefficients positifs on a :

$$MV_1 = V_1 \Leftrightarrow \begin{pmatrix} \sum_{j=1}^n m_{1j} \\ \sum_{j=1}^n m_{2j} \\ \vdots \\ \sum_{j=1}^n m_{nj} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \forall i = 1, 2, \dots, n, \sum_{j=1}^n m_{ij} = 1.$$

Donc M est stochastique si, et seulement si, $MV_1 = V_1$.

2. (a) Soit $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}, B = (b_{ij})_{1 \leq i, j \leq n} \in \mathcal{S}_n$. Posons $C = AB = (c_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$.

- Pour tout $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2, c_{i,j} = \sum_{k=1}^n a_{ik}b_{kj} \geq 0$ (tous les termes de cette expression étant positifs)

- $(AB)V_1 = A(BV_1) = AV_1 = V_1$, d'après ce qui précède, appliqué successivement à B puis à A . Ainsi, d'après la caractérisation des matrices stochastiques obtenue en 1., $AB \in \mathcal{S}_n$.

(b) Par récurrence évidente, A^k appartient à $\mathcal{S}_n$ puisque cet ensemble est stable pour le produit de matrices.

3. (a) Toute matrice stochastique laisse V_1 invariant, donc c'est un vecteur propre associé à la valeur propre 1.

(b) Soit $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n} \in \mathcal{S}_n$. Pour tout $x \in \mathbb{C}^n$, on a :

$$\|f(x)\| = \max_{1 \leq i \leq n} \left| \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \right| \leq \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n |a_{ij}x_j| \leq \left(\max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n a_{ij} \right) \|x\| \leq \|x\|.$$

Si λ est une valeur propre, alors il existe x un vecteur non nul tel que $f(x) = \lambda x$, on obtient donc :

$$|\lambda x| = |\lambda| \|x\| \leq \|x\|$$

et comme x est non nul, on en déduit que $|\lambda| \leq 1$.

4. (a) Si y un élément de l'ensemble $\text{Im}(f - \text{Id}) \cap \ker(f - \text{Id})$ il existe x de $\mathbb{C}^n$ tel que $y = f(x) - x$ mais puisque y appartient aussi par hypothèse à $\ker(f - \text{Id})$, on a aussi : $f(y) = y$.

- On a $f(x) = y + x$.

- On a $f(y) = y = f^2(x) - f(x)$, ce qui donne : $f^2(x) = y + f(x) = 2y + x$.

On peut conjecturer que, pour tout entier $k \geq 1$: $f^k(x) = ky + x$. Si on suppose cette relation vraie au rang k , on obtient en composant par f :

$$f^{k+1}(x) = f(ky + x) = kf(y) + f(x) = ky + (x + y) = (k + 1)y + x.$$

La propriété est donc bien vérifiée pour tout $k \in \mathbb{N}$.

De cette relation, on déduit que :

$$\left| f^k(x) \right| + |x| \geq \left| f^k(x) - x \right| = k|y|.$$

Comme $|f(x)| \leq |x|$, alors peut vérifier que $|f^k(x)| \leq |x|$ pour tout $k \in \mathbb{N}$. On obtient alors

$$k|y| \leq |f^k(x) - x| \leq |f^k(x)| + |x| \leq 2|x|.$$

y est nécessairement nul, puisque $\mathbb{R}$ est archimédien.

- (b) On en déduit que les deux sous-espaces $\text{Im}(f - \text{Id})$ et $\text{ker}(f - \text{Id})$ ont une intersection réduite au zéro. Mais d'après le théorème du rang, la somme de leurs dimensions est égale à la dimension de $\mathbb{C}^n$, d'où :

$$\mathbb{C}^n = \text{Im}(f - \text{Id}) \oplus \text{ker}(f - \text{Id}).$$

5. Si λ une valeur propre de f autre que 1, et x est un vecteur propre associé, alors :

$$f(x) - x = \lambda x - x = (\lambda - 1)x.$$

Donc, $(\lambda - 1)x$ appartient par construction à $\text{Im}(f - \text{Id})$, et puisque le coefficient $\lambda - 1$ est non nul, il en est de même de x .

Donc, si λ est une valeur propre autre que 1, $E_\lambda(f) = \text{ker}(f - \text{Id}) \subset \text{Im}(f - \text{Id})$.

6. (a) Si P est la matrice de passage de la base canonique à la base $\mathcal{B}'$, alors $M^k = PD^kP^{-1}$. La convergence d'une suite de matrice équivaut à la convergence de l'autre.
 (b) Notons $D = \text{diag}(1, \dots, 1, \lambda_{r+1}, \dots, \lambda_n)$. D'après les propriétés des matrices diagonales pour tout $k \in \mathbb{N}$, $D^k = \text{diag}(1, \dots, 1, \lambda_{r+1}^k, \dots, \lambda_n^k)$.

Les suites de termes $(\lambda_i^k)_{k \in \mathbb{N}}$ convergent si et seulement si, ou bien $\lambda_i = 1$ (auquel cas la suite des puissances est stationnaire), ou bien leur module est strictement inférieur à 1 (auquel cas, il y a convergence vers 0). Donc, $(D^k)_{k \in \mathbb{N}}$ converge si et seulement s'il n'y a pas d'autre valeur propre de module 1 que 1 lui-même. Dans ce conditions on a :

$$\lim_{k \rightarrow \infty} M^k = P \text{diag}(1, \dots, 1, 0, \dots, 0)P^{-1}.$$

- (c) La matrice $L = P \text{diag}(1, \dots, 1, 0, \dots, 0)P^{-1}$ vérifie $L^2 = L$, elle représente la projection sur $\text{Im}(f - \text{Id})$ parallèlement à $\text{ker}(f - \text{Id})$.

Partie 2. Application à une situation probabiliste

Graph probabiliste représentant la situation probabiliste :

1. (a) Soit l'événement B_3 : « choisir chaque année la région 2 durant les 3 premières années. » On a donc

$$B_3 = A_2(1) \cap A_2(2) \cap A_2(3).$$

La formule des probabilités composées donne

$$p(B_3) = p[A_2(1)] \times p[A_2(2)/A_2(1)] \times p[A_2(3)/A_2(1) \cap A_2(2)].$$

D'après l'hypothèse $\boxed{H_5}$, $p[A_2(3)/A_2(1) \cap A_2(2)] = p[A_2(3)/A_2(2)]$, donc

$$p(B_3) = \alpha_2(1) \times a_{22}^2 = 0,45 \times (0,3)^3 = 0,0405.$$

De même, $B_n = A_2(1) \cap A_2(2) \cap \dots \cap A_2(n)$, donc toujours d'après la formule des probabilités composées,

$$p(B_n) = p[A_2(1)] \prod_{i=1}^{n-1} p[A_2(i+1)/A_2(i)] = 0,45 \times (0,3)^{n-1}.$$

(b) Le système $\{A_1(1), A_2(1), A_3(1)\}$ étant complet d'après les hypothèses $\boxed{H_1}$ et $\boxed{H_2}$, donc d'après la formule de Bayes :

$$\begin{aligned} p[A_2(1)/A_1(2)] &= \frac{p[A_1(2)/A_2(1)] \times p[A_2(1)]}{\sum_{i=1}^3 p[A_1(2)/A_i(1)] \times p[A_i(1)]} \\ &= \frac{0,45 \times 0,1}{0,2 \times 0,3 + 0,45 \times 0,1 + 0,35 \times 0,6} \\ &= \frac{9}{63} \sim 0,143. \end{aligned}$$

(c) Soit C l'événement : « l'individu change de région entre la première et la deuxième année. » On a :

$$\bar{C} = [A_1(1) \cap A_1(2)] \cup [A_2(1) \cap A_2(2)] \cup [A_3(1) \cap A_3(2)].$$

$$\begin{aligned} 1 - p(C) &= p[A_1(2)/A_1(1)] \times p[A_1(1)] + p[A_2(2)/A_2(1)] \times p[A_2(1)] + p[A_3(2)/A_3(1)] \times p[A_3(1)] \\ &= \alpha_1(1)a_{11} + \alpha_2(1)a_{22} + \alpha_3(1)a_{33} = 0,265 \end{aligned}$$

Soit $p(C) = 0,735$.

2. (a) Le système $\{A_1(n), A_2(n), A_3(n)\}$ étant complet d'après les hypothèses $\boxed{H_1}$ et $\boxed{H_2}$, donc d'après la formule de Bayes, on a pour tout $i \in \llbracket 1, 3 \rrbracket$:

$$p[A_i(n+1)] = \sum_{j=1}^3 p[A_i(n+1)/A_j(n)] \times p[A_j(n)].$$

Soit $\forall i \in \llbracket 1, 3 \rrbracket$, $\alpha_i(n+1) = \sum_{j=1}^3 \alpha_{ij} \alpha_j(n)$ ce qui exprime l'égalité matricielle suivante :

$$\begin{pmatrix} \alpha_1(n+1) \\ \alpha_2(n+1) \\ \alpha_3(n+1) \end{pmatrix} = M \begin{pmatrix} \alpha_1(n) \\ \alpha_2(n) \\ \alpha_3(n) \end{pmatrix}.$$

Soit en réécrivant toutes ces relations aux temps $t = n, t = n - 1$ jusqu'à $t = 2$:

$$\begin{pmatrix} \alpha_1(n) \\ \alpha_2(n) \\ \alpha_3(n) \end{pmatrix} = M^n \begin{pmatrix} \alpha_1(1) \\ \alpha_2(1) \\ \alpha_3(1) \end{pmatrix}.$$

(b) Calculons :

$$\begin{aligned} \det(M) &= \begin{vmatrix} 0,3 & 0,1 & 0,6 \\ 0,5 & 0,3 & 0,2 \\ 0,2 & 0,6 & 0,2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0,5 & 0,3 & 0,2 \\ 0,2 & 0,6 & 0,2 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0,5 & -0,2 & -0,3 \\ 0,2 & 0,4 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -0,2 & -0,3 \\ 0,4 & 0 \end{vmatrix} = 0,12. \end{aligned}$$

Soit $\det(M) = 0,12$.

(c) Cherchons le polynôme caractéristique de M :

$$\begin{aligned} P(\lambda) = \det(\lambda I_3 - M) &= \begin{vmatrix} \lambda - 0,3 & -0,1 & -0,6 \\ -0,5 & \lambda - 0,3 & -0,2 \\ -0,2 & -0,6 & \lambda - 0,2 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} \lambda - 1 & \lambda - 1 & \lambda - 1 \\ -0,5 & \lambda - 0,3 & -0,2 \\ -0,2 & -0,6 & \lambda - 0,2 \end{vmatrix} = (\lambda - 1) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -0,5 & \lambda - 0,3 & -0,2 \\ -0,2 & -0,6 & \lambda - 0,2 \end{vmatrix} \\ &= (\lambda - 1) \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -0,5 & \lambda + 0,2 & 0,3 \\ -0,2 & -0,4 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda - 1) \begin{vmatrix} \lambda + 0,2 & 0,3 \\ -0,4 & \lambda \end{vmatrix}. \end{aligned}$$

Soit $\det(M) = (\lambda - 1)(\lambda^2 + 0,2\lambda + 0,12)$. Les valeurs propres de M sont les racines du polynôme caractéristique, elles sont donc $1, -0,1 + i\sqrt{0,11}$ et $-0,1 - i\sqrt{0,11}$.

(d) M admet trois valeurs propres distinctes complexes, donc elle est diagonalisable dans $\mathbb{C}$, soit P la matrice de passage de la base initiale à la base de vecteurs propres. On a donc

$$M = PDP^{-1} \text{ et } M^n = PD^nP^{-1} \text{ pour tout } n \in \mathbb{N}$$

avec $D = \text{diag}(1, \lambda, \bar{\lambda})$ ($\lambda = -0,1 + i\sqrt{0,11}$). La première colonne de P est un vecteur propre associée à la valeur propre 1. Vérifions que le vecteur de composantes $(1, 1, 1)$ est vecteur propre associé à 1. Calculons :

$$M \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,3 & 0,1 & 0,6 \\ 0,5 & 0,3 & 0,2 \\ 0,2 & 0,6 & 0,2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

La matrice de passage est bien du type :

$$P = \begin{pmatrix} 1 & x' & x'' \\ 1 & y' & y'' \\ 1 & z' & z'' \end{pmatrix} \text{ et } M = P \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda^n & 0 \\ 0 & 0 & \bar{\lambda}^n \end{pmatrix} P^{-1}.$$

3. (a) L'application linéaire $X \mapsto PXP^{-1}$ de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ étant continue (propriété des applications linéaires continues en dimension finie), alors comme $|\lambda| < 1$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} M^n = P \lim_{n \rightarrow \infty} \text{diag} \left(1, \lambda^n, \bar{\lambda}^n \right) P^{-1} = P \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} P^{-1}.$$

Or

$$P \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & x' & x'' \\ 1 & y' & y'' \\ 1 & z' & z'' \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & a' & a'' \\ b & b' & b'' \\ c & c' & c'' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & a' & a'' \\ a & a' & a'' \\ a & a' & a'' \end{pmatrix}.$$

$$\text{Soit } \lim_{n \rightarrow \infty} M^n = \begin{pmatrix} a & a' & a'' \\ a & a' & a'' \\ a & a' & a'' \end{pmatrix}.$$

(b) En utilisant le résultat de la question 2. de la première partie précédente, on a la somme des éléments de chaque colonne de M^n est 1.

Posons $M^n = (m_{ij}^{(n)})_{1 \leq i, j \leq 3}$ et $L = (l_{ij})_{1 \leq i, j \leq 3} = \lim_{n \rightarrow \infty} M^n$. On a alors, pour tout $j \in \llbracket 1, 3 \rrbracket$, $\sum_{i=1}^3 m_{ij}^{(n)} =$

1, donc par passage à la limite on obtient : $\sum_{i=1}^3 l_{ij} = 1$. Ainsi par unicité de la limite $3a = 3a' = 3a'' = 1$,

soit donc $a = a' = a'' = \frac{1}{3}$.