Devoir libre n°02
Correction

N'hésitez pas de me signaler les erreurs rencontrées.

Partie I

1. Soient $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$ et $B = (b_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$ deux matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et λ un nombre réel. On a :

$$\text{tr}(A + \lambda B) = \sum_{i=1}^n (a_{ii} + \lambda b_{ii}) = \sum_{i=1}^n a_{ii} + \lambda \sum_{i=1}^n b_{ii} = \text{tr}(A) + \lambda \text{tr}(B).$$

Donc T est bien linéaire.

2. Posons $C = AB = (c_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$ et $D = BA = (d_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$, avec $c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj}$ et $d_{ij} = \sum_{k=1}^n b_{ik} a_{kj}$,

donc :

$$\text{tr}(AB) = \sum_{i=1}^n c_{ii} = \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{ki} = \sum_{k=1}^n \sum_{i=1}^n b_{ki} a_{ik} = \sum_{k=1}^n d_{kk} = \text{tr}(BA).$$

3. Si M et M' sont semblables, alors il existe P inversible tel que $M' = P^{-1}MP$ et donc

$$\text{tr}(M') = \text{tr}(P^{-1}MP) = \text{tr}(PP^{-1}M) = \text{tr}(M).$$

4. On vérifie facilement que $E_{ij}E_{kl} = \delta_{jk}E_{il}$, pour tout $(i, j, k, l) \in \mathbb{N}_n^4$.

Partie II

1. Il est clair que Θ est non vide (il contient l'application trace), de plus si φ et ϕ sont dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})^*$ et $\lambda \in \mathbb{R}$, alors $\varphi + \lambda\phi \in \Theta$. Donc Θ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})^*$.
2. (a) On sait que $E_{ij}E_{ii} = \delta_{ij}E_{ii}$ et donc

$$\begin{aligned} \delta_{ij}\varphi(E_{ii}) &= \varphi(E_{ij}E_{ii}) = \varphi(E_{ii}E_{ij}) \\ &= \varphi(\delta_{ii}E_{ij}) = \varphi(E_{ij}). \end{aligned}$$

(b) De même $\varphi(E_{ii}) = \varphi(E_{ij}E_{ji}) = \varphi(E_{ji}E_{ij}) = \varphi(E_{jj})$.

3. Soit $\varphi \in \Theta$. D'après 2.,

$$\varphi(E_{ij}) = \begin{cases} 0, & \text{si } i \neq j \\ \text{cte}, & \text{si } i = j. \end{cases}$$

Ainsi si $M = \sum_{1 \leq i, j \leq n} m_{ij} E_{ij} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, alors $\varphi(A) = \sum_{i=1}^n m_{ii}\varphi(E_{ii}) = \lambda \text{tr}(M)$ avec $\lambda \in \mathbb{R}$.

Conclusion : si $\varphi \in \Theta$, alors φ et tr sont colinéaires, c'est-à-dire Θ est sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})^*$ de dimension 1 ; il est engendré par l'application trace.

Partie III

1. Il est clair que L est linéaire.
2. On trouve $L(E_{ij}) = (\lambda_i - \lambda_j)E_{ij}$.

3. On remarque que la famille $\{ E_{ij} \mid i \neq j \}$ engendre $\text{Im } L$, et comme cette famille est libre (sous-famille d'une famille libre), alors forme une base de $\text{Im}(L)$. D'où $\text{rg}(L) = \dim \text{Im}(L) = n^2 - n$.
 REMARQUE : $\text{Im}(L)$ est le sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ des matrices dont les éléments diagonaux sont nuls.
4. Soit $P \in \mathbf{GL}_n(\mathbb{R})$ tel que $C' = P^{-1}CP$. Il suffit donc de prendre $X = PX'P^{-1}$ et $Y = PY'P^{-1}$.
5. Vérifions que f est homothétie, en effet, soient x et y de V , alors il existe λ_x, λ_y et λ_{x+y} des scalaires tels que

$$f(x) = \lambda_x x, f(y) = \lambda_y y \text{ et } f(x + y) = \lambda_{x+y}(x + y).$$

Si x et y sont libres, la condition $(\lambda_{x+y} - \lambda_x)x + (\lambda_{x+y} - \lambda_y)y = 0$ implique $\lambda_y = \lambda_x$, et si $y = \alpha x$, alors

$$f(y) = f(\alpha x) = \alpha f(x) = \alpha \lambda_x x = \lambda_y y = \lambda_y \alpha x,$$

donc $\lambda_y = \lambda_x$. Ainsi il existe $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que pour tout $x \in E$, $f(x) = \lambda x$, c'est-à-dire f est une homothétie.

6. Il faut montrer que toute matrice de trace nulle est semblable à une matrice dont tous les éléments diagonaux sont nuls.

CAS $n = 2$: Soit f l'endomorphisme canoniquement associé à C . Supposons que pour tout $x \in \mathbb{R}^2$, x et $f(x)$ sont colinéaires, d'après 5. f est une homothétie de rapport λ . Mais $\text{tr}(C) = 2\lambda = 0$, donc $\lambda = 0$ et $C = 0$. Supposons $C \neq 0$, donc il existe $x \neq 0$ de $\mathbb{R}^2$ tel que $(x, f(x))$ soit une base, donc C est semblable à une matrice de la forme

$$C' = \begin{pmatrix} 0 & \alpha \\ 1 & \beta \end{pmatrix}$$

et comme $\text{tr}(C) = 0$, alors $\text{tr}(C') = \beta = 0$, donc C est semblable à la matrice C' dont les éléments diagonaux sont nuls.

Établissons le résultat demandé en raisonnant par récurrence sur la taille de la matrice C . Si C est taille 1, le résultat est triviale. Pour $n = 2$ on a montré que toute matrice de trace nulle est semblable à une matrice dont les éléments diagonaux sont nuls.

Supposons la propriété établie au rang $n - 1$. Soit C une matrice carrée d'ordre n de trace nulle et f l'endomorphisme canoniquement associé à C . Montrons que C est semblable à une matrice de la forme

$$B = \begin{pmatrix} 0 & * & \dots & * \\ 1 & & & \\ \vdots & & N & \\ 0 & & & \end{pmatrix}, \quad N \in \mathcal{M}_{n-1}(\mathbb{R}).$$

Si C est matrice d'une homothétie alors $\text{tr}(C) = 0$ permet de conclure $C = 0$. Sinon, il existe $x \in E$ tel que x et $f(x)$ sont non colinéaires. En introduisant une base dont x et $f(x)$ sont les deux premiers vecteurs, on obtient que la matrice C est semblable à une matrice de la forme B , avec $\text{tr}(N) = \text{tr}(B) = \text{tr}(C) = 0$. Soit donc $P \in \mathbf{GL}_n(\mathbb{R})$ tel que

$$P^{-1}CP = B = \begin{pmatrix} 0 & * & \dots & * \\ 1 & & & \\ \vdots & & N & \\ 0 & & & \end{pmatrix}.$$

Par l'hypothèse de récurrence il existe $R \in \mathbf{GL}_{n-1}(\mathbb{R})$ et $U \in \mathcal{M}_{n-1}(\mathbb{R})$ à éléments diagonaux nuls vérifiant $R^{-1}NR = U$, alors la matrice $C' = (PQ)^{-1}C(PQ)$ où

$$Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & R \end{pmatrix}$$

a ses éléments diagonaux nuls et semblable à C .

7. Si $C = XY - YX$ alors C est de trace nulle. Supposons que C est de trace nulle, d'après 6. C est semblable à une matrice $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ dont les éléments diagonaux sont nuls, donc il P inversible tel que $C = P^{-1}BP$ et d'après 6., il existe $C' \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ tel que $B = DC' - C'D$ où D est une matrice diagonale, ainsi

$$\begin{aligned} C &= P^{-1}BP = P^{-1}DC'P - P^{-1}C'DP \\ &= P^{-1}DPP^{-1}C'P - P^{-1}C'PP^{-1}DP \\ &= XY - YX \end{aligned}$$

avec $X = P^{-1}DP$ et $Y = P^{-1}C'P$.

•••••