Devoir libre n°08
Correction

N'hésitez pas de me signaler les erreurs rencontrées.

Partie 1 : Calcul de $\zeta(2)$

① Pour x réel et n entier naturel non nul donnés, on a

$$\cos((2n + 1)x) + i \sin((2n + 1)x) = (\cos x + i \sin x)^{2n+1} = \sum_{k=0}^n i^k \mathbb{C}_{2n+1}^k \cos^{2n+1-k} x \sin^k x.$$

puis par identification des parties imaginaires

$$\sin(2n + 1)x = \sum_{k=0}^n (-1)^k \mathbb{C}_{2n+1}^k \cos^{2(n-k)} x \sin^{2k+1} x$$

et enfin en divisant les deux membres par $\sin^{2n+1} x$ pour $x \notin S = \{ k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \}$, on obtient

$$\frac{\sin(2n + 1)x}{\sin^{2n+1} x} = \sum_{k=0}^n (-1)^k \mathbb{C}_{2n+1}^k \cot^{2(n-k)} x.$$

② Tout d'abord, pour $1 \leq k \leq n$, on a $0 < \frac{k\pi}{2n+1} \leq \frac{n\pi}{2n+1} < \frac{n\pi}{2n} = \frac{\pi}{2}$. Ainsi les nombres $\frac{k\pi}{2n+1}$, $1 \leq k \leq n$, sont deux à deux distincts et dans $]0, \frac{\pi}{2}[$. Par injectivité de la fonction $x \mapsto \cot x$ sur $]0, \frac{\pi}{2}[$, les n nombres $\cot\left(\frac{k\pi}{2n+1}\right)$, $1 \leq k \leq n$, sont deux à deux distincts et de plus strictement positifs. Finalement, les n réels x_k sont deux à deux distincts.

Maintenant, pour $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $P(x_k) = \frac{\sin(k\pi)}{\sin^{2n+1}\left(\frac{k\pi}{2n+1}\right)} = 0$. On a donc trouvé n réels deux à deux

distincts racines du polynôme $P = \sum_{k=0}^n (-1)^k \mathbb{C}_{2n+1}^k x^{n-k}$ qui est de degré n .

③ Les relations entre coefficients et racines d'un polynôme permettent d'affirmer que

$$\sum_{k=1}^n x_k = -\frac{\mathbb{C}_{2n+1}^k}{\mathbb{C}_{2n+1}^k} = \frac{(2n+1)(2n)(2n-1)}{6(2n+1)} = \frac{n(2n-1)}{3}.$$

Donc

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \sum_{k=1}^n \cot^2\left(\frac{k\pi}{2n+1}\right) = \frac{n(2n-1)}{3}.$$

Ensuite, pour $x \notin S$, $\frac{1}{\sin^2 x} = 1 + \cot^2 x$ et donc

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{\sin^2\left(\frac{k\pi}{2n+1}\right)} = \sum_{k=1}^n \left(1 + \cot^2\left(\frac{k\pi}{2n+1}\right)\right) = n + \frac{n(2n-1)}{3} = \frac{2n(n+1)}{3}.$$

- ④ Les fonctions $\sin$ et $\tan$ sont respectivement strictement concaves et strictement convexes sur $]0, \frac{\pi}{2}[$. On en déduit que les graphes de ces fonctions sont respectivement strictement au-dessous et strictement au-dessus de leur tangente en $(0, 0)$ sur $]0, \frac{\pi}{2}[$ et donc

$$\forall x \in]0, \frac{\pi}{2}[, \sin x < x < \tan x.$$

- (a) Puisque, pour $x \in]0, \frac{\pi}{2}[$, $\sin x < x < \tan x$, on a aussi après passage à l'inverse et élévation au carré

$$\forall x \in]0, \frac{\pi}{2}[, \cot^2 x < \frac{1}{x^2} < \frac{1}{\sin^2 x}.$$

Pour $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $\frac{k\pi}{2n+1}$ est dans $]0, \frac{\pi}{2}[$ et donc,

$$\cot^2 \left(\frac{k\pi}{2n+1} \right) < \frac{(2n+1)^2}{k^2\pi^2} < \frac{1}{\sin^2 \frac{k\pi}{2n+1}}.$$

En sommant ces inégalités, on obtient

$$\frac{n(2n-1)}{3} = \sum_{k=1}^n \cot^2 \left(\frac{k\pi}{2n+1} \right) < \frac{(2n+1)^2}{\pi^2} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} < \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sin^2 \left(\frac{k\pi}{2n+1} \right)} = \frac{2n(n+1)}{3},$$

ou encore

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \frac{n(2n-1)}{3(2n+1)^2} \pi^2 < \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} < \frac{2n(n+1)}{3(2n+1)^2} \pi^2.$$

- (b) Lorsque on fait tendre n vers plus l'infini, les deux suites à gauche et à droite de l'encadrement précédent convergent vers la même valeur, on peut donc conclure que la série $\sum_{p \in \mathbb{N}^*} \frac{1}{p^2}$ existe et que

$$\sum_{p=1}^{\infty} \frac{1}{p^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

- ⑤ Remarquons d'abord que les deux séries $\sum_{p \in \mathbb{N}^*} \frac{(-1)^p}{p^2}$ et $\sum_{p \in \mathbb{N}^*} \frac{1}{(2p+1)^2}$ sont absolument convergentes. Notons $(S_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ la suite de sommes partielles associée à la série $\sum_{p \in \mathbb{N}^*} \frac{1}{p^2}$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a :

$$S_{2n} = \sum_{p=1}^{2n} \frac{1}{p^2} = \sum_{p=1}^n \frac{1}{(2p)^2} + \sum_{p=0}^{n-1} \frac{1}{(2p+1)^2} = \frac{1}{4} S_n + \sum_{p=0}^{n-1} \frac{1}{(2p+1)^2}.$$

D'où par passage à la limite :

$$\sum_{p=1}^{\infty} \frac{1}{(2p+1)^2} = \frac{\pi^2}{6} - \frac{\pi^2}{24} = \frac{\pi^2}{8}.$$

De même, on a :

$$\sum_{p=1}^{2n} \frac{(-1)^{p-1}}{p^2} = - \sum_{p=1}^n \frac{1}{(2p)^2} + \sum_{p=0}^{n-1} \frac{1}{(2p+1)^2} = -\frac{1}{4} S_n + \sum_{p=0}^{n-1} \frac{1}{(2p+1)^2}.$$

D'où par passage à la limite :

$$\sum_{p=1}^{\infty} \frac{(-1)^{p-1}}{p^2} = -\frac{1}{4} \frac{\pi^2}{6} + \frac{\pi^2}{8} = \frac{\pi^2}{12}.$$

Partie 2 : Application

- ① La fonction g est définie sur $] - 1, 0[\cup] 0, +\infty[$ et on a $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$. Ainsi, on peut prolonger g par continuité en 0 en posant $g(0) = 1$.

De plus, on sait que :

$$\forall x \in] - 1, 1[, \ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n,$$

donc h est développable en série entière et

$$\forall x \in] - 1, 1[, h(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^{n-1}.$$

Enfin, g est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $] - 1, 0[\cup] 0, +\infty[$, donc h aussi. De plus, h étant développable en série entière au voisinage de 0, h est aussi de classe $\mathcal{C}^\infty$ en 0. Donc la fonction h est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $] - 1, +\infty[$.

- ② La fonction h étant continue sur $[0, 1]$, elle est intégrable sur ce segment. Pour tout $r \in] 0, 1[$, on a :

$$\int_0^r \frac{\ln(1+x)}{x} dx = \int_0^r \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^{n-1} \right) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} \int_0^r x^{n-1} dx = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2} r^n.$$

La fonction $r \mapsto \int_0^r \frac{\ln(1+x)}{x} dx$ est continue sur $[0, 1]$ et la série entière $\sum_{n \in \mathbb{N}^*} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2} r^n$ a pour rayon de convergence 1 et, de plus, elle converge en $r = 1$, d'après le théorème d'Abel, elle est aussi continue en 1 et donc :

$$\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{x} dx = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2} = \frac{\pi^2}{12}.$$

Partie 3 : Calcul des intégrales

- ① Les fonctions $x \mapsto \frac{\ln x}{1-x^2}$ et $x \mapsto \frac{\ln x}{1-x}$ sont continues et se prolongent par continuité en 1. De même, la fonction $x \mapsto \frac{\ln x}{1+x}$ est continue sur $] 0, 1]$.

Au voisinage de 0, on a :

$$\frac{\ln x}{1-x^2} \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \ln x, \quad \frac{\ln x}{1-x} \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \ln x \quad \text{et} \quad \frac{\ln x}{1+x} \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \ln x.$$

et la fonction $\ln$ est intégrable sur $[0, 1]$.

Ceci montre que les intégrales J , K et L sont convergentes.

② On peut donc écrire

$$K + L = \int_0^1 \left(\frac{\ln x}{1-x} + \frac{\ln x}{1+x} \right) dx = 2 \int_0^1 \frac{\ln x}{1-x^2} dx$$

soit

$$K + L = 2J.$$

③ Avec le changement de variable $x = t^2$, donc $dx = 2tdt$, on obtient :

$$K = \int_0^1 \frac{\ln(t^2)}{1-t^2} 2tdt = 4 \int_0^1 \frac{t \ln t}{1-t^2} dt,$$

d'où

$$K + 4L = 4 \int_0^1 \left(\frac{x \ln x}{1-x^2} + \frac{\ln x}{1+x} \right) dx = 4 \int_0^1 \frac{\ln x}{1-x^2} dx,$$

et donc $k + 4L = 4J$.

④ Soit $a \in]0, 1[$. On effectue une intégration par parties :

$$\int_a^1 \frac{\ln x}{1+x} dx = [\ln x \ln(1+x)]_a^1 - \int_a^1 \frac{1}{x} \ln(1+x) dx = -\ln a \ln(1+a) - \int_a^1 \frac{\ln(1+x)}{x} dx.$$

Donc, en faisant tendre a vers 0 on obtient :

$$L = - \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{x} dx = -\frac{\pi^2}{12}.$$

Mais, on a $K + L = 2J$ et $K + 4L = 4J$, donc $J = \frac{3}{2}L = -\frac{\pi^2}{8}$ et $K = \frac{4}{3}J = -\frac{\pi^2}{6}$.

⑤ • La fonction $x \mapsto \frac{\ln x}{1-x^2}$ est continue sur $]1, +\infty[$ et on sait qu'elle est prolongeable par continuité en 1. Elle est donc intégrable sur tout segment de $[1, +\infty[$. De plus $\frac{\ln x}{1-x^2} \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} o\left(\frac{1}{x^{\frac{3}{2}}}\right)$.

Donc l'intégrale $\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{1-x^2} dx$ converge.

En posant le changement de variable $x = \frac{1}{t}$, on obtient :

$$\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{1-x^2} dx = \int_1^0 \frac{\ln\left(\frac{1}{t}\right)}{1-\left(\frac{1}{t}\right)^2} \left(\frac{-dt}{t^2}\right) = \int_0^1 \frac{\ln t}{1-t^2} dt = J = -\frac{\pi^2}{8}.$$

• La fonction $x \mapsto \frac{1}{x} \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right)$ est continue sur $]0, 1[$, elle est donc intégrable sur tout segment de $]0, 1[$. De plus, cette fonction est prolongeable par continuité en 0 et vérifie

$$\frac{1}{x} \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right) \underset{x \rightarrow 1}{\sim} -\ln(1-x),$$

et l'intégrale $\int_0^1 \ln(1-x) dx$ converge. Donc l'intégrale $\int_0^1 \frac{1}{x} \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right) dx$ est convergente.