Devoir surveillé n°02

Correction

N'hésitez pas de me signaler les erreurs rencontrées.

Exercice I

Exercice II

1. Puisque E est de dimension finie, on en déduit que l'application linéaire I est continue.
2. On sait que $\forall P \in E, P(X) = \sum_{j=0}^n P(a_j)l_j(X)$, en particulier, $\forall i \in \llbracket 0, n \rrbracket, P(b_i) = \sum_{j=0}^n P(a_j)l_j(b_i)$ et donc

$$|P(b_i)| \leq \left(\sum_{j=0}^n |l_j(b_i)| \right) N_a(P) \leq \max_{0 \leq k \leq n} \left(\sum_{j=0}^n |l_j(b_k)| \right) N_a(P).$$

D'où :

$$\forall P \in E, N_b(P) \leq M N_a(P)$$

où $M = \max_{0 \leq k \leq n} \left(\sum_{j=0}^n |l_j(b_k)| \right)$. Ceci montre, en particulier, que $\|I\| \leq M$.

Soit k_0 tel que $\max_{0 \leq k \leq n} \left(\sum_{j=0}^n |l_j(b_k)| \right) = \left(\sum_{j=0}^n |l_j(b_{k_0})| \right)$. On définit alors λ_j pour tout $j \in \llbracket 0, n \rrbracket$, par :

$$\lambda_j = \begin{cases} 1 & \text{si } l_j(b_{k_0}) > 0 \\ 0 & \text{si } l_j(b_{k_0}) = 0 \\ -1 & \text{si } l_j(b_{k_0}) < 0 \end{cases}$$

puis on pose $P(X) = \sum_{j=0}^n \lambda_j l_j(X)$. Donc $P(b_{k_0}) = \sum_{j=0}^n |l_j(b_{k_0})|$ et $N_a(P) = \max_{0 \leq j \leq n} |\lambda_j| \leq 1$. D'où :

$$\begin{aligned} \max_{0 \leq i \leq n} \sum_{j=0}^n |l_j(b_i)| &= \sum_{j=0}^n |l_j(b_{k_0})| = P(b_{k_0}) \\ &\leq \|I\| N_a(P) \\ &\leq \|I\| \end{aligned}$$

et par conséquent $\|I\| = \max_{0 \leq i \leq n} \sum_{j=0}^n \prod_{k \neq j} \left| \frac{b_i - a_k}{a_j - a_k} \right|$.

3. Remarquons que dans ce cas, pour tout $(i, j) \in \llbracket 0, n \rrbracket^2$, on a :

$$\begin{aligned} l_j(-1-i) &= \prod_{k \neq j} \left(\frac{-i-1-k}{j-k} \right) \\ &= \frac{(-1)^n (i+1) \dots (n+i+1)}{(i+j+1)j(j-1) \dots 1 \cdot (-1)(-2) \dots (j-n)} \\ &= \frac{(-1)^j (n+i+1)!}{i+j+1} \frac{1}{i!} \frac{1}{j!(n-j)!} \\ &= \frac{(-1)^j (n+1)}{i+j+1} \mathbf{C}_{n+i+1}^{n+1} \mathbf{C}_n^j \end{aligned}$$

Par conséquent, $\forall i \in \llbracket 0, n \rrbracket$:

$$\begin{aligned} \Delta_i &= \sum_{j=0}^n |l_j(-1-i)| \\ &= (n+1)\mathfrak{C}_{n+i+1}^{n+1} \sum_{j=0}^n \frac{\mathfrak{C}_n^j}{i+j+1} \\ &= \frac{(i+1)\dots(n+i+1)}{n!} \sum_{j=0}^n \frac{\mathfrak{C}_n^j}{i+j+1} \end{aligned}$$

On remarque que $(\Delta_i)_{0 \leq i \leq n}$ est croissante, en effet, on a :

$$\begin{aligned} \Delta_{i+1} - \Delta_i &= \frac{(i+2)\dots(n+i+2)}{n!} \sum_{j=0}^n \frac{\mathfrak{C}_n^j}{i+j+2} - \frac{(i+1)\dots(n+i+1)}{n!} \sum_{j=0}^n \frac{\mathfrak{C}_n^j}{i+j+1} \\ &= \frac{(i+2)\dots(n+i+1)}{n!} \sum_{j=0}^n \left(\frac{n+i+2}{i+j+2} - \frac{i+1}{i+j+1} \right) \mathfrak{C}_n^j \\ &= \frac{(i+2)\dots(n+i+1)}{n!} \sum_{j=0}^n \left(\frac{n(i+j+1)+j}{(i+j+2)(i+j+1)} \right) \mathfrak{C}_n^j \geq 0 \end{aligned}$$

D'où $\|I\| = \max_{0 \leq i \leq n} \Delta_i = \Delta_n = \frac{(2n+1)!}{(n!)^2} \sum_{j=0}^n \frac{\mathfrak{C}_n^j}{i+j+1}$. Dans le cas de $n=2$, on trouve $\|I\| = 31$.

4. On a $\Delta_n = \frac{(2n+1)!}{(n!)^2} \sum_{j=0}^n \mathfrak{C}_n^j \int_0^1 x^{n+j} dx = \frac{(2n+1)!}{(n!)^2} \int_0^1 x^n \sum_{j=0}^n \mathfrak{C}_n^j x^j dx = \mathfrak{C}_{2n+1}^n I_n$ où

$$I_n = (n+1) \int_0^1 x^n (1+x)^n dx.$$

Avec le changement de variable $v = x(1+x)$, c'est-à-dire $x = \frac{\sqrt{4v+1}-1}{2}$, on a $I_n = \int_0^2 \frac{(n+1)v^n}{\sqrt{4v+1}} dv$, puis par intégration par parties, on trouve :

$$\begin{aligned} I_n &= \left[\frac{v^{n+1}}{\sqrt{4v+1}} \right]_0^2 + 2 \int_0^2 \frac{v^{n+1}}{(4v+1)^{\frac{3}{2}}} dv \\ &= \frac{2^{n+1}}{3} + 2 \int_0^2 \frac{v^{n+1}}{(4v+1)^{\frac{3}{2}}} dv \end{aligned}$$

De plus, $0 \leq \int_0^2 \frac{v^{n+1}}{(4v+1)^{\frac{3}{2}}} dv \leq \int_0^2 v^{n+1} dv = \frac{2^{n+2}}{n+2}$ et donc $I_n \sim \frac{2^{n+1}}{3}$. Ainsi, à l'aide de la formule de Stirling¹,

$$\Delta_n \sim \frac{2}{3} 2^n \mathfrak{C}_{2n+1}^n \sim \frac{4}{3\sqrt{\pi}} \frac{2^{3n}}{\sqrt{n}}.$$

Exercice III

- 1.
- 2.

1. La formule de Stirling $n! \sim \sqrt{2\pi n} e^{-n} n^n$

3. Soient P et Q des polynômes de degrés respectifs d et r , tels que $P = \sum_{i=0}^d a_i X^i$ et $Q = \sum_{j=0}^r a_j X^j$. On alors :

$$\begin{aligned}
 |b_c(P, Q)| &= |P(c)||Q(c)| \\
 &= \left| \sum_{i=0}^d a_i c^i \right| \left| \sum_{j=0}^r b_j c^j \right| \\
 &\leq \left(\sum_{i=0}^d |a_i| |c|^i \right) \left(\sum_{j=0}^r |b_j| |c|^j \right) \\
 &\leq \|P\| \|Q\| \left(\sum_{i=0}^d |c|^i \right) \left(\sum_{j=0}^r |c|^j \right) \\
 &\leq \|P\| \|Q\| \frac{1 - |c|^{d+1}}{1 - |c|} \frac{1 - |c|^{r+1}}{1 - |c|}
 \end{aligned}$$

Puis comme $|c| < 1$, alors pour tout couple $(P, Q) \in E \times E$, on a :

$$|b_c(P, Q)| \leq \left(\frac{1}{1 - |c|} \right)^2 \|P\| \|Q\|.$$

On en déduit que b_c est continue et que $\|b_c\| \leq \left(\frac{1}{1 - |c|} \right)^2$.

Pour montrer l'égalité dans l'autre sens, on considère, pour tout entier $n \geq 1$, le polynôme P définie par $P_n = 1 + X + \dots + X^n$, donc on a :

$$b_c(P_n, P_n) = \left(\sum_{k=0}^n c^k \right)^2 = \left(\frac{1 - c^{n+1}}{1 - c} \right)^2$$

puis comme $|b_c(P_n, P_n)| \leq \|b_c\| \|P_n\|^2$ et comme $\|P_n\| = 1$, alors pour tout entier $n \geq 1$, on a :

$$\left(\frac{1 - c^{n+1}}{1 - c} \right)^2 \leq \|b_c\|.$$

Donc en faisant tendre n vers l'infini, on aura pour $c \in [0, 1[$,

$$\left(\frac{1}{1 - c} \right)^2 \leq \|b_c\|.$$

En considérant maintenant le polynôme Q_n défini pour tout $n \geq 1$, par $Q_n = 1 - X + X^2 \dots + (-1)^n X^n$. On montre de la même manière que pour $c \in]-1, 0]$, on a :

$$\left(\frac{1}{1 + c} \right)^2 \leq \|b_c\|.$$

Donc finalement, on a :

$$\begin{aligned}
 &\leq \|b_c\| = \left(\frac{1}{1 - |c|} \right)^2 \\
 &\bullet \bullet \bullet \bullet \bullet \bullet \bullet \bullet \bullet \bullet
 \end{aligned}$$