Devoir surveillé n°5

Correction

Exercice

1. On a $F'(x) = f(x)$ et $F(\frac{1}{2}) = 0$, une intégration par parties donne :

$$\begin{aligned} c_k(F) &= \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} F(x)x^k dx \\ &= \left[F(x)x^{\frac{k+1}{2}} \right]_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} - \frac{1}{k+1} \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} f(x)x^{k+1} dx \\ &= \frac{F(\frac{1}{2})}{(k+1)2^{k+1}} - \frac{1}{k+1} c_{k+1}(f). \end{aligned}$$

Soi $P = \sum a_k X^k$ un polynôme à coefficients réels, alors on a :

$$\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} f(x)P(x)dx = \sum_{k=0}^n a_k \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} f(x)x^k dx = \sum_{k=0}^n a_k c_k(f).$$

2. (a) Soit $0 \leq h \leq \frac{1}{2}$ et $h \leq a \leq 1 - h$. On a ϕ_h est paire et $\phi'_h(t) = \frac{-2t}{1-h^2}$, d'où le tableau de variation de ϕ_h .

x	0	1
$\phi'(x)$	-	
$\phi(x)$	$\frac{1}{1-h^2}$	0

Tableau de variation et courbe de ϕ .

(b) Si $t \in]-h, h[$, $\phi_h(t) > 1$, donc $\lim_{n \rightarrow \infty} [\phi_h(t)]^n = +\infty$.

Si $t \in]-1, -h[\cup]h, 1[$, $\phi_h(t) < 1$, donc $\lim_{n \rightarrow \infty} [\phi_h(t)]^n = 0$.

Si $t = \pm h$, on a $\phi_h(t) = 1$, donc $\lim_{n \rightarrow \infty} [\phi_h(t)]^n = 1$.

Nous avons

$$v_n(a) = \int_{a-1}^{-h} [\phi_n(t)]^n dt + \int_{-h}^{-a} [\phi_n(t)]^n dt + \int_h^{-a} [\phi_n(t)]^n dt$$

Il existe $t_0 \in]a-1, h[$ tel que $\int_{a-1}^{-h} [\phi_n(t)]^n dt = (1-a-h)[\phi_n(t_0)]^n$ et donc $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{a-1}^{-h} [\phi_n(t)]^n dt = 0$

Il existe $t_1 \in]-h, h[$ tel que $\int_{-h}^{-a} [\phi_n(t)]^n dt = 2h[\phi_n(t_1)]^n$ et donc $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-h}^{-a} [\phi_n(t)]^n dt = +\infty$

Il existe $t_2 \in]h, a[$ tel que $\int_h^{-a} [\phi_n(t)]^n dt = (a-h)[\phi_n(t_2)]^n$ et donc $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_h^{-a} [\phi_n(t)]^n dt = +\infty$

En conclusion $\lim_{n \rightarrow \infty} v_n(a) = +\infty$.

(c) La fonction $g : [a - 1, a] \rightarrow \mathbb{R}$ est continue et vérifie $g(t) \geq m$ pour tout $t \in [a - 1, a]$, donc

$$\int_{a-1}^a g(t)[\phi_n(t)]^n dt \geq m \int_{a-1}^a [\phi_n(t)]^n dt = m v_n(a).$$

D'autre part, on sait que $\lim_{n \rightarrow \infty} v_n(a) = +\infty$, donc il existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que $\forall n \geq n_0, v_n(a) \geq 1$ et donc

$$\int_{a-1}^a g(t)[\phi_n(t)]^n dt \geq m > 0$$

dès que $n \geq n_0$.

3. (a) f étant continue et $f(0) \neq 0$, donc il existe $0 < h \leq \frac{1}{2}$ tel que $\forall x \in [-h, h], f(x) \neq 0$. On peut supposer $f(x) > 0$ pour tout $x \in [-h, h]$, donc f est minorée par un nombre strictement positif dans l'intervalle $[-h, h]$. Supposons que $\forall k \in \mathbb{N}, c_k(f) = 0$, donc par linéarité

$\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} f(x)x^k dx = 0$ pour tout polynôme P à coefficients réels, et comme $x \mapsto [\phi_h(x)]^n$ est une

fonction polynomiale, alors $\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} f(x)[\phi_h(x)]^n dx = 0$, mais ceci est en contradiction avec le résultat de la question 3. c) (avec $a = \frac{1}{2}$). Donc les $c_k(f)$ ne sont pas tous nuls.

Si $f(x_0) \neq 0$ pour $x_0 \in]\frac{-1}{2}, \frac{1}{2}[$, considérons $f_1(x) = f(x_0 - x)$, donc $f_1(x_0) \neq 0$. D'autre part,

$$\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} f(x)[\phi_h(x)]^n dx = \int_{x_0-\frac{1}{2}}^{x_0+\frac{1}{2}} f(x_0 - t)[\phi_h(x_0 - t)]^n dt \stackrel{x=x_0-t}{=} \int_{x_0+\frac{1}{2}-1}^{x_0+\frac{1}{2}} f_1(t)[\phi_h(x_0 - t)]^n dt.$$

Le même raisonnement faite au debut de cette question montre que $\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} f(x)[\phi_h(x)]^n dx > 0$ (

avec $a = x + \frac{1}{2}$), ce qui est absurde.

- (b) Il est clair que l'application $f \mapsto (c_k(f))_{k \in \mathbb{N}}$ est linéaire. Supposons que $c_k(f) = 0$ pour tout $k \in \mathbb{N}$, si $f \neq 0$ alors il existe un $x_0 \in]\frac{-1}{2}, \frac{1}{2}[$ tel que $f(x_0) \neq 0$, donc d'après ce qui précède les $c_k(f)$ ne sont pas tous nuls ce qui est impossible, donc $f = 0$ sur $]\frac{-1}{2}, \frac{1}{2}[$ et grace à la continuité de f , f est nulle sur $[\frac{-1}{2}, \frac{1}{2}]$.

PROBLÈME : ÉQUATION DE GAUSS

Partie I : Quelques résultats préliminaires

1. (a) Pour tout $x \in]-1, 1[$, la fonction $\theta \mapsto \frac{1}{\sqrt{1-x^2 \sin^2 \theta}}$ est continue sur $[0, \frac{\pi}{2}]$, donc intégrable sur $[0, \frac{\pi}{2}]$. De même, pour tout $x \in]0, +\infty[$, la fonction $\theta \mapsto \frac{1}{\sqrt{\cos^2 \theta + x^2 \sin^2 \theta}}$ est continue sur $[0, \frac{\pi}{2}]$, donc intégrable sur $[0, \frac{\pi}{2}]$. Donc F et G sont bien définies.

- (b) Si $x \in]-1, 1[$ alors $\sqrt{1-x^2} \in]0, 1[$, donc

$$F(\sqrt{1-x^2}) = \frac{2}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d\theta}{\sqrt{1-(1-x^2)\sin^2 \theta}} = \frac{2}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d\theta}{\sqrt{1-\sin^2 \theta + x^2 \sin^2 \theta}} = G(x).$$

2. (a) La fonction $\theta \mapsto \frac{1 - \cos \theta}{\sin \theta}$ est continue sur $]0, \frac{\pi}{2}[$ et se prolonge par continuité par 0 en 0, donc cette fonction est intégrable sur $[0, \frac{\pi}{2}]$.
- (b) On a $\frac{1 - \cos \theta}{\sin \theta} = \frac{\sin \frac{\theta}{2}}{\cos \frac{\theta}{2}}$, d'où :

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1 - \cos \theta}{\sin \theta} d\theta \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin \frac{\theta}{2}}{\cos \frac{\theta}{2}} d\theta \\ &= -2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d(\cos \frac{\theta}{2})}{\cos \frac{\theta}{2}} \\ &= -2 [\ln(\cos \frac{\theta}{2})]_0^{\frac{\pi}{2}} = \ln 2. \end{aligned}$$

- (c) Il est clair que h est continue sur $]0, +\infty[\times]0, \frac{\pi}{2}[$ comme rapport et composé de fonctions continues. De plus l'inégalité $0 < h(x, \theta) \leq \frac{1 - \cos \theta}{\sin \theta}$, valable pour tout $(x, \theta) \in]0, +\infty[\times]0, \frac{\pi}{2}[$, montre que h est continue en $(0, 0)$.
- (d) En utilisant le changement de variable on obtient une nouvelle expression de G :

$$G(x) = \frac{2}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d\theta}{\sqrt{\sin^2 \theta + x^2 \cos^2 \theta}}.$$

On obtient donc la relation :

$$G(x) - K(x) = \frac{2}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} h(x, \theta) d\theta.$$

Par théorème de continuité des fonctions définies par une intégral, l'application $x \mapsto \int_0^{\frac{\pi}{2}} h(x, \theta) d\theta$ est continue sur $[0, +\infty[$, en particulier

$$\lim_{x \rightarrow 0} (G(x) - K(x)) = \frac{2}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} h(0, \theta) d\theta = \frac{2}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1 - \sin \theta}{\cos \theta} d\theta = \frac{2}{\pi} I.$$

- (e) Pour tout $x > 0$, on a :

$$K(x) \stackrel{t=\cos \theta}{=} \frac{2}{\pi} \int_0^1 \frac{dt}{\sqrt{t^2 + x^2(1-t^2)}} = \frac{2}{\pi x} \int_0^1 \frac{dt}{\sqrt{1 + \frac{1-x^2}{x} t^2}}.$$

- Si $x \in]0, 1[$, on utilise le changement de variable $u = \frac{\sqrt{1-x^2}}{x} t$, donc :

$$\begin{aligned} K(x) &= \frac{2}{\pi \sqrt{1-x^2}} \int_0^{\frac{\sqrt{1-x^2}}{x}} \frac{du}{\sqrt{1+u^2}} \\ &= \frac{2}{\pi \sqrt{1-x^2}} \left[\ln(u + \sqrt{1+u^2}) \right]_0^{\frac{\sqrt{1-x^2}}{x}} \\ &= \frac{2}{\pi \sqrt{1-x^2}} \left(\ln(1 + \sqrt{1-x^2}) - \ln x \right) \end{aligned}$$

- Si $x \in]1, +\infty[$, on utilise le changement de variable $u = \frac{\sqrt{x^2 - 1}}{x}t$, donc :

$$\begin{aligned} K(x) &= \frac{2}{\pi\sqrt{x^2 - 1}} \int_0^{\frac{\sqrt{x^2 - 1}}{x}} \frac{du}{\sqrt{1 - u^2}} \\ &= \frac{2}{\pi\sqrt{x^2 - 1}} [\arcsin(u)]_0^{\frac{\sqrt{x^2 - 1}}{x}} \\ &= yu \end{aligned}$$

- Si $x = 1$, $K(x) = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi \cos \theta d\theta = \frac{2}{\pi}$.

Pour $x \in]0, 1[$, on a

$$\begin{aligned} G(x) &= K(x) + \frac{2}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} h(x, \theta) d\theta \\ &= \frac{2}{\pi\sqrt{1 - x^2}} \ln(1 + \sqrt{1 - x^2}) - \frac{2}{\pi\sqrt{1 - x^2}} \ln x + \frac{2}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} h(x, \theta) d\theta \\ &\underset{0^+}{\sim} -\frac{2}{\pi} \ln x + \frac{2}{\pi} \ln 2 \end{aligned}$$

D'où $G(x) = -\frac{2}{\pi} \ln x + \frac{4}{\pi} \ln 2 + o_{0^+}(1)$.

- (f) D'après la formule de la moyenne il existe $\theta_0 \in]0, \frac{\pi}{2}[$ tel que $G(x) = \frac{2}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d\theta}{\sqrt{\cos^2 \theta + x^2 \sin^2 \theta}} =$

$$\frac{1}{\sqrt{\cos^2 \theta_0 + x^2 \sin^2 \theta_0}}, \text{ donc } \lim_{x \rightarrow \infty} G(x) = 0.$$

3. On sait que $\frac{1}{\sqrt{1 - t}} = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2} t^n$ pour $t \in]-1, 1[$, donc pour $x \in]-1, 1[$ et $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$, on a :

$$\frac{1}{\sqrt{1 - x^2 \sin^2 \theta}} = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2} x^{2n} \sin^{2n} \theta.$$

La dernière série converge uniformément en θ sur $[0, \frac{\pi}{2}]$ puisque $|\frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2} x^{2n} \sin^{2n} \theta| \leq \frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2} x^{2n}$

et la série $\sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2} x^{2n}$ converge. Donc on peut intégrer terme à terme cette série, d'où :

$$F(x) = \frac{2}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d\theta}{\sqrt{1 - x^2 \sin^2 \theta}} = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2} x^{2n} \frac{2}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n} \theta d\theta = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} (w_{2n})^2 x^{2n}.$$

4.

x	1	$+\infty$
$\zeta'(x)$		-
$\zeta(x)$	$+\infty$	1

Tableau de variation et courbe de ζ .

5. Supposons qu'il existe $\alpha \in \mathbb{R}$ tel que $F_1 = \alpha G_1$, donc $\forall x \in]0, 1[$, $F_1(x) = \alpha G_1(x)$, en particulier $F_1(\frac{1}{2}) = \alpha G_2(\frac{1}{2}) = \alpha F_1(\frac{1}{2})$ (la question 1. (b) de cette partie), donc $\alpha = 1$. D'autre part, l'égalité $\lim_{x \rightarrow 0^+} F_1(x) = \alpha \lim_{x \rightarrow 0^+} G_1(x)$ entraîne $1 = \alpha \infty$ ce qui est absurde. Donc F_1 et G_1 ne sont pas proportionnelles

Partie II : Solutions de l'équation de Gauss

1. En dérivant et en remplaçant dans l'expression de $\mathcal{L}(f)$, on trouve :

$$\forall x \in]-R, R[, \mathcal{L}(f)(x) = -a_1 + \sum_{n=1}^{\infty} (n^2 a_{n-1} - (n+1)^2 a_{n+1}) x^n.$$

Donc $b_0 = -a_1$ et $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $b_n = n^2 a_{n-1} - (n+1)^2 a_{n+1}$.

2. Supposons que $(\mathcal{S})$ admet une solution développable en série entière au voisinage de 0, notée f . Posons $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ pour $x \in]-R, R[$ où $R > 0$ désigne le rayon de convergence de cette série. D'après ce qui précède f est solution de $(\mathcal{S})$ si, et seulement si, $a_1 = 0$ et $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $a_{n+1} = \left(\frac{n}{n+1}\right)^2 a_{n-1}$, donc $a_{2p+1} = 0$ pour tout $p \in \mathbb{N}$ et

$$a_{2p} = \left(\frac{2p-1}{2p}\right)^2 a_{2(p-1)} = \left(\frac{(2p)!}{2^{2p}(p!)^2}\right)^2 a_0.$$

Donc $f(x) = \left(1 + \sum_{p=0}^{\infty} w_{2p}^2 x^{2p}\right) a_0 = a_0 F(x)$ et $R = 1$.

3. La fonction g vérifie $(x^3 - x)g''(x) + (3x^2 - 1)g'(x) + xg(x) = 0$ pour tout $x \in]0, 1[$, donc g est $]0, 1[$ -solution de $(\mathcal{S})$.
4. L'ensemble de solutions de $(\mathcal{S})$ est un espace vectoriel de dimension 2.
 Sur $]0, 1[$, F_1 et G_1 sont deux solutions de $(\mathcal{S})$ qui sont linéairement indépendantes, donc elles engendrent l'espace de solutions.
 Sur $] - 1, 0[$ F est solution de $(\mathcal{S})$, on note F_2 la restriction de cette fonction sur $] - 1, 0[$. Posons $G_2(x) = G_1(-x)$ pour $x \in] - 1, 0[$. Les deux fonctions sont deux solutions linéairement indépendantes de $(\mathcal{S})$ sur $] - 1, 0[$.
 Sur $] - 1, 1[$ F et G sont deux solutions linéairement indépendantes de $(\mathcal{S})$.
5. On trouve $A(t) = -t^4 + t^2$ et $B(t) = -t^3 - t$.
6. Pour $t \in J$, on a :

$$(t^2 - t^4)g''(t) - (t^3 + t)g'(t) + g(t) = -t^2[(t^3 - t)f''(t) + (3t^2 - 1)f'(t) + tf(t)].$$

Donc si f est J -solution de $(\mathcal{S})$, alors g est J -solution de $(\mathcal{E})$.

7. Si $I =]0, 1[$, alors $J =]1, +\infty[$. Si f est J -solution, alors $t \mapsto tf(t)$ est I -solution, donc $tf(t) = F(t)$ puis $F(t) = \frac{1}{t}f(t)$. Donc les $]1, +\infty[$ -solutions de $(\mathcal{S})$ sont des combinaisons des fonctions $t \mapsto \frac{1}{t}F_1(t)$ et $t \mapsto \frac{1}{t}G_1(t)$.

De même les $] - \infty, -1[$ -solutions de $(\mathcal{S})$ sont des combinaisons des fonctions $t \mapsto \frac{1}{t}F_2(t)$ et $t \mapsto \frac{1}{t}G_2(t)$.