MP – CPGE MOHAMMED VI-KÉNITRA
Année scolaire 24/25

DEVOIR LIBRE n°2

à rendre le 30/09/2025

Exercice 1

Pour tout $x \in \mathbb{Z}$, on appelle classe de x , notée $\bar{x}$, l'ensemble des entiers congrus à x modulo 7. On appelle $\mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$ l'ensemble des classes d'équivalence modulo 7 et $(\mathbb{Z}/7\mathbb{Z})^*$ l'ensemble des classes d'équivalence modulo 7 différentes de $\bar{0}$.

On appelle groupe engendré $\bar{x}$ par l'ensemble des puissances de $\bar{x}$, c'est-à-dire $\{\bar{x}^k \mid k \in \mathbb{Z}\}$. On appelle $\mathbf{U}_6 = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\}$ l'ensemble des racines sixième de l'unité.

1. **1a.** Calculer $\bar{3}^k$ pour $k \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$.

1b. Déterminer $\bar{3}^k$ pour tout $k \in \mathbb{Z}$. On pourra utiliser la division euclidienne de k par 6.

2. Pour quelle raison $((\mathbb{Z}/7\mathbb{Z})^*, \cdot)$ est-il un groupe ?

3. Montrer que le groupe engendré par $\bar{3}$ est égal à $(\mathbb{Z}/7\mathbb{Z})^*$.

4. Soit φ définie pour tout par

$$\varphi(\bar{3}^k) = e^{\frac{ik\pi}{3}}.$$

4a. Montrer φ que est bien définie.

4b. Montrer que φ est un morphisme de $((\mathbb{Z}/7\mathbb{Z})^*, \cdot)$ sur $(\mathbf{U}_6, \cdot)$.

4c. Déterminer le noyau de φ et en déduire que φ est un isomorphisme (morphisme bijectif) de $((\mathbb{Z}/7\mathbb{Z})^*, \cdot)$ sur $(\mathbf{U}_6, \cdot)$.

Exercice 2

Soient r et s les applications de $\mathbb{C}$ dans lui-même définies comme suit :

$$\begin{array}{l} r : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C} \\ z \mapsto iz \end{array} \quad \text{et} \quad \begin{array}{l} s : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C} \\ z \mapsto \bar{z} \end{array}$$

Dans tout l'exercice, on identifiera l'application f de $\mathbb{C}$ dans $\mathbb{C}$, avec l'application du plan complexe dans lui-même, qui à un point M d'affixe z associe le point M' d'affixe $f(z)$.

1. On note r_2 et r_3 les composées $r^2 = r \circ r$ et $r^3 = r \circ r \circ r$. Interpréter comme transformations géométriques du plan complexe les applications $r, r^2, r^3, s, s \circ r, s \circ r^2$ et $s \circ r^3$.

2. On note e l'application identité du plan complexe. Montrer que l'ensemble,

$$\{e, r, r^2, r^3, s, s \circ r, s \circ r^2, s \circ r^3\}$$

muni de la composition des applications est un groupe, dont on donnera la table de composition. Il sera noté G .

3. Montrer que $\{e, r^2\}$, $\{e, s\}$, $\{e, s \circ r\}$, $\{e, s \circ r^2\}$, $\{e, s \circ r^3\}$, sont des sous-groupes de G , tous isomorphes à $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.

4. Montrer que $\{e, s, r^2, s \circ r^2\}$ est un sous-groupe de G , isomorphe à $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.

5. Montrer que $\{e, r, r^2, r^3\}$ est un sous-groupe de G , isomorphe à $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$.

6. On note :

A_1 le point du plan complexe d'affixe $1 + i$,

A_2 le point du plan complexe d'affixe $-1 + i$,

A_3 le point du plan complexe d'affixe $-1 - i$,

A_4 le point du plan complexe d'affixe $1 - i$.

Vérifier que chaque élément du groupe G laisse invariant l'ensemble $\{A_1, A_2, A_3, A_4\}$.

7. Étant donné un élément f du groupe G , on lui associe la permutation $\varphi(f)$ de $\{1, 2, 3, 4\}$ définie par :

$$\forall i, j \in \{1, 2, 3, 4\}, \varphi(f)(i) = (j) \Leftrightarrow f(A_i) = A_j.$$

On définit ainsi une application φ de G dans $\mathcal{S}_4$. Montrer que φ est un morphisme de groupes.

8. Écrire en extension l'image par φ de chacun des éléments de G .

9. Soit H l'image de G par φ . Montrer que H est un sous-groupe de $\mathcal{S}_4$, isomorphe à G .

FIN DE L'ÉPREUVE