Devoir libre n°6

à rendre le 16/01/2012

Exercice 1 L'espace vectoriel $\mathbb{R}^3$ étant muni de sa structure euclidienne canonique. Pour tout $(a, b, \lambda) \in \mathbb{R}^3$, on note $M(a, b, \lambda)$ ou simplement M matrice :

$$M(a, b, \lambda) = \begin{pmatrix} \lambda + a & -a & b \\ -a & \lambda + a & b \\ b & b & \lambda \end{pmatrix}$$

Pour tout vecteurs $U = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ et $V = \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}$ de $\mathbb{R}^3$, on pose $\phi(U, V) = {}^t U M V$. ϕ étant alors la forme bilinéaire symétrique associée à M , on note Q sa forme quadratique.

1. Écrire l'expression de $Q(U)$ en fonction de x, y et z .
2. On suppose le long de cette question que $\lambda = 0$.
 - (a) Étudier selon a et b le rang de la forme quadratique Q .
 - (b) On suppose que $a = 0$ et $b \neq 0$. Alors

$$Q(U) = 2b(x + y)z.$$

- i. Donner le rang de Q puis une base de son noyau.
- ii. Utiliser la méthode de Gauss pour calculer la signature de Q .

- (c) On suppose que $a \neq 0$ et $b = 0$. Alors

$$Q(U) = a(x - y)^2.$$

Donner le rang de Q et sa signature, puis une base de son noyau.

- (d) On suppose que $ab \neq 0$. Alors
 - i. Utiliser le calcul de la question 2.(b) ii, pour réduire $Q(U)$ en somme de carrés.
 - ii. Donner alors, en justifiant, la signature de Q .
3. On suppose le long de cette question que $\lambda = 3, a = -1$ et $b = -1$. Alors

$$Q(U) = 2x^2 + 2y^2 + 3z^2 + 2xy - 2xz - 2yz.$$

- (a) Réduire en carrés, par la méthode de Gauss, la forme quadratique $Q(U)$.
- (b) En déduire alors le rang et la signature de Q .
- (c) Déterminer une base Q -orthogonale.
4. On suppose le long de cette question que $\lambda = 2, a = -1$ et $b = 1$. Alors

$$Q(U) = x^2 + y^2 + 2z^2 + 2xy + 2xz + 2yz.$$

- (a) Réduire en carrés, par la méthode de Gauss, la forme quadratique $Q(U)$.

Pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, on pose $u(x, y) = \begin{pmatrix} x \\ xy \\ y \end{pmatrix}$, puis $f(x, y) = Q(u(x, y))$.

- (b) Calculer explicitement $f(x, y)$, puis justifier que f est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}^2$.
- (c) Vérifier que f admet exactement deux points critiques, que l'on précisera. (indication : on pourra remarquer que $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 2(y + 1)(x + xy + y)$)
- (d) Utiliser la question 4.(a) pour montrer que l'un de ces points critiques (à préciser) correspond à un minimum global de f .
- (e) Vérifier que $f(-2 + t, -1 + t) - f(-2, -1) = 2t^3 + o(t^3)$. Qu'en déduit-on pour l'autre point critique.

Exercice 2 *Partie I. Calcul de la somme d'une série convergente*

1. Vérifier, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$: $\int_0^\pi \left(\frac{t^2}{2\pi} - t \right) \cos(nt) dt = \frac{1}{n^2}$.

2. Établir, pour tout $m \in \mathbb{N}^*$ et tout t de $]0, \pi[$:

$$\frac{1 - e^{imt}}{1 - e^{it}} e^{it} = \frac{\sin \frac{tm}{2}}{\sin \frac{t}{2}} e^{i\frac{(m+1)t}{2}}, \text{ puis } \sum_{n=1}^m \cos(nt) = \frac{\cos \frac{(m+1)t}{2} \sin \frac{mt}{2}}{\sin \frac{t}{2}}.$$

3. Soit $u : [0, \pi] \rightarrow \mathbb{R}$ une application de classe $\mathcal{C}^1$. Montrer, à l'aide d'une intégration par parties que

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \int_0^\pi u(t) \sin(\lambda t) dt = 0.$$

4. Soit l'application $f : [0, \pi] \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(t) = \frac{t^2 - t}{2 \sin \frac{t}{2}}$ si $t \in]0, \pi[$ et $f(0) = -1$. Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0, \pi]$

5. Montrer que pour tout $m \in \mathbb{N}^*$, $\sum_{n=1}^m \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{2} + \int_0^\pi f(t) \sin \frac{(2m+1)t}{2} dt$. Puis que $\sum_{n=1}^\infty \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{2}$.

Partie II- Etude d'une somme de série de fonctions

1. Montrer que, pour tout x de $[0, +\infty[$, la série $\sum_{n \in \mathbb{N}^*} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+x} \right)$ converge.

On note S sa somme, pour tout x de $[0, +\infty[$, $S(x) = \sum_{n=1}^\infty \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+x} \right)$ et pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $S_n(x) = \sum_{k=0}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+x} \right)$

2. Calculer $S(0)$ et $S(1)$.

3. Étudier la suite $(S(n) - S_n(n))_{n \in \mathbb{N}^*}$ et conclure que la série S ne converge pas uniformément sur $[0, +\infty[$.

4. Dans cette question, on veut démontrer que S est continue sur $[0, +\infty[$.

- (a) Montrer que pour tout $A > 0$, la série converge uniformément sur $[0, A]$.
- (b) En déduire que S est continue sur $[0, +\infty[$.

5. Dans cette question, on veut démontrer que S est dérivable sur $[0, +\infty[$.

- (a) Montrer que la série $\sum_{n \in \mathbb{N}^*} \frac{1}{(n+x)^2}$ converge uniformément sur $[0, +\infty[$.

- (b) En déduire que S est dérivable sur $[0, +\infty[$ et que $S'(x) = \sum_{n=1}^\infty \frac{1}{(n+x)^2}$.

6. Montrer que S est deux fois dérivable sur $[0, +\infty[$ et qu'elle est concave.

7. Soit $x \in]0, +\infty[$ fixé. On note φ la fonction définie sur $[1, +\infty[$ par : $\forall t \in [1, +\infty[$, $\varphi(t) = \frac{1}{t} - \frac{1}{t+x}$.

- (a) Montrer que l'intégrale $\int_0^{+\infty} \varphi(t) dt$ converge et calculer sa valeur.

- (b) Montrer : $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $\varphi(n+1) \leq \int_n^{n+1} \varphi(t) dt \leq \varphi(n)$, et en déduire : $\int_1^{+\infty} \varphi(t) dt \leq S(x) \leq 1 + \int_1^{+\infty} \varphi(t) dt$.

- (c) Conclure que $S(x)$ équivaut à $\ln x$ en $+\infty$.

8. Dresser le tableau de variation de S , en précisant la limite de S en $+\infty$. Puis tracer l'allure de la courbe représentative de S .