

Exercice 1

Représenter les ensembles de définition des fonctions suivantes :

$$f_1(x, y) = \ln(2x + y - 2), f_2(x, y) = \sqrt{1 - xy}$$

$$f_3(x, y) = \frac{\ln(y - x)}{x},$$

$$f_4(x, y) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 - 1}} + \sqrt{4 - x^2 - y^2}.$$

Exercice 2

Soit  $f$  une application de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $\mathbb{R}^2$ . Calculer les dérivées (éventuellement partielles) des fonctions suivantes :

- $g(x, y) = f(y, x)$ .
- $g(x) = f(x, x)$ .
- $g(x, y) = f(y, f(x, x))$ .
- $g(x) = f(x, f(x, x))$ .

Exercice 3

Calculer la différentielle de l'application  $f : \mathbb{C}^* \rightarrow \mathbb{C}$  définie par  $f(z) = \frac{1}{z}$ .

Exercice 4

Soit  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  la fonction définie par

$$f(x, y) = \frac{x^2y + 3y^3}{x^2 + y^2} \text{ pour } (x, y) \neq (0, 0),$$

$$f(0, 0) = 0.$$

- La fonction  $f$  est-elle continue en  $(0, 0)$ ? Justifier la réponse.
- La fonction  $f$  admet-elle des dérivées partielles par rapport à  $x$ , à  $y$  en  $(0, 0)$ ? Donner la ou les valeurs le cas échéant et justifier la réponse.
- La fonction  $f$  est-elle différentiable en  $(0, 0)$ ? Justifier la réponse.
- Déterminer les dérivées partielles de  $f$  en un point  $(x_0, y_0) \neq (0, 0)$ .
- Soit  $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$  la fonction définie par  $F(x, y) = (f(x, y), f(y, x))$ . Déterminer la matrice jacobienne de  $F$  au point  $(1, 1)$ . La fonction  $F$  admet-elle une réciproque locale au voisinage du point  $(2, 2)$ ?

Exercice 5

On considère les fonctions  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$  et  $g : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$  définies par

$$f(x, y) = (\sin(xy), y \cos x, xy \sin(xy) \exp(y^2))$$

et

$$g(u, v, w) = uvw$$

- Calculer explicitement  $g \circ f$ .
- En utilisant l'expression trouvée en (1.), calculer les dérivées partielles de  $g \circ f$ .

- Déterminer les matrices jacobienes  $Jf(x, y)$  et  $Jg(u, v, w)$  de  $f$  et de  $g$ .
- Retrouver le résultat sous (2.) en utilisant un produit approprié de matrices jacobienes.

Exercice 6

Soit  $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction de classe  $\mathcal{C}^1$  et soit  $g : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$  la fonction définie par :

$$g(x, y, z) = f(x - y, y - z, z - x)$$

Montrer que

$$\frac{\partial g}{\partial x} + \frac{\partial g}{\partial y} + \frac{\partial g}{\partial z} = 0$$

Exercice 7

Soit  $E$  un espace vectoriel euclidien.

- En quels points l'application  $x \mapsto \|x\|_2$  est-elle différentiable?
- Préciser en ces points le vecteur gradient.

Exercice 8

- Soit  $f : \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  définie par  $f(M) = M^2$ . Justifier que  $f$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  et déterminer la différentielle de  $f$  en tout  $M$  de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ .
- Soit  $f : \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$  définie par  $f(M) = \text{Tr}(M^3)$ . Justifier que  $f$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  et calculer la différentielle de  $f$  en tout point  $M$  de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ .
- Déterminer la différentielle en  $I_n$  puis en  $M \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{R})$  de l'application  $f : M \rightarrow M^{-1}$ .

Exercice 9

Soit  $f$  une application de  $\mathbb{R}^n$  dans  $\mathbb{R}$  de classe  $\mathcal{C}^1$ . On dit que  $f$  est positivement homogène de degré  $r$  ( $r$  réel donné) si et seulement si  $\forall \lambda \in ]0, +\infty[$ ,  $\forall x \in \mathbb{R}^n$ ,  $f(\lambda x) = \lambda^r f(x)$ .

- Montrer pour une telle fonction l'identité d'Euler :  $\forall x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ ,  $\sum_{i=1}^n x_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(x) = r f(x)$  (1)
- Montrer que (1) caractérise les fonctions homogènes de degré  $r$ .
- Soit  $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$  une matrice d'ordre  $n$ , et soit  $\det(A) = f(a_{11}, a_{12}, \dots, a_{1n})$  développement par rapport à la première ligne.

$$\text{Montrer que } \det(A) = \sum_{i=1}^n a_{1i} \frac{\partial f}{\partial a_{1i}}(a_{11}, a_{12}, \dots, a_{1n}).$$

Exercice 10

Soit  $f$  la fonction numérique définie sur  $\mathbb{R}^2$  par :

$$f(x, y) = \begin{cases} xy \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

- Montrer que  $f$  est différentiable en  $(0, 0)$  et que sa différentielle est l'application linéaire nulle.

- Montrer que  $f$  ainsi que ses dérivées partielles sont continues sur  $\mathbb{R}^2$ .
- Montrer que les dérivées partielles d'ordre 2 existent en chaque point de  $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ .
- Que peut-on dire de  $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0,0)$  et  $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0,0)$ ? Conclure.

**Exercice 11**

Montrer que l'application  $\varphi : (u, v) \rightarrow (u + v, uv)$  définit un  $C^1$ -difféomorphisme de  $U = \{(u, v) \in \mathbb{R}^2 / u < v\}$  vers un ouvert  $V$  que l'on précisera.

**Exercice 12**

Soit  $f$  une fonction de  $\mathbb{R}^2$  dans  $\mathbb{R}$  de classe  $C^2$  telle que  $\Delta f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0$  et  $g(r, t) = f(r \cos t, r \sin t)$ .

- Trouver une relation liant  $\frac{\partial}{\partial r} \left( r \frac{\partial g}{\partial r} \right)$  et  $\frac{\partial^2 g}{\partial t^2}$ ,  $\left( r \frac{\partial}{\partial r} \left( r \frac{\partial g}{\partial r} \right) \right)$  et  $-\frac{\partial^2 g}{\partial t^2}$
- Montrer que  $\varphi : r \rightarrow \int_0^{2\pi} f(r \cos t, r \sin t) dt$  est de classe  $C^2$  sur  $\mathbb{R}$  et que  $(r\varphi'(r))' = 0$ .
- Conclure que  $\varphi$  est constante.

**Exercice 13**

Déterminer les extremums locaux et globaux des fonctions numériques définies sur  $\mathbb{R}^2$  par :

- $f_1(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy$
- $f_2(x, y) = \arctan xy$
- $f_3(x, y) = x^2 y^2 e^{-x^2 - y^2}$
- $f_5(x, y) = \sin x \sin y$

**Exercice 14**

Étudier les extremums locaux et globaux des fonctions numériques définies sur  $\mathbb{R}^3$  par :

- $f_1(x, y, z) = x^2 y + y^2 z + 2x - z$
- $f_2(x, y, z) = x^2 y^2 + (x^2 - y^2)z - 4z$ .

**Exercice 15**

Soit  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  une application de classe  $\mathcal{C}^1$ .

- On définit, pour  $(x, y) \in \mathbb{R}^2$  fixé,  $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $t \mapsto g(t) = f(tx, ty)$ . Montrer que  $g$  est dérivable sur  $\mathbb{R}$ , et calculer sa dérivée.
- On suppose désormais que  $f(tx, ty) = tf(x, y)$  pour tous  $x, y, t \in \mathbb{R}$ .

a. Montrer que pour tous  $x, y, t \in \mathbb{R}$ , on a

$$f(x, y) = \frac{\partial f}{\partial x}(tx, ty)x + \frac{\partial f}{\partial y}(tx, ty)y.$$

- En déduire qu'il existe des réels  $\alpha$  et  $\beta$  que l'on déterminera tels que, pour tous  $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ , on a  $f(x, y) = \alpha x + \beta y$ .

**Exercice 16**

Résoudre l'équation aux dérivées partielles  $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) - 3\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 0$  sur  $\mathbb{R}^2$ , en réalisant le changement de variables  $(x, y) \rightarrow (u = 2x + y, v = 3x + y)$ .

**Exercice 17**

En passant en coordonnées polaires, déterminer les fonctions  $f : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^{+*} \rightarrow \mathbb{R}$  de classe  $C^1$  solution de l'équation aux dérivées partielles

$$y \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) - x \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = f.$$

**Exercice 18**

Soit  $E$  un espace de Banach. Notons  $I$  l'application identité de  $E$  et  $\mathcal{L}(E)$  l'ensemble des endomorphismes de  $E$ .

Soit  $v \in \mathcal{L}(E)$  tel que  $\|v\| < 1$ . Montrer que  $I - v$  est inversible et exprimer son inverse. Indication : résoudre l'équation  $x - u(x) = y$  où  $y$  est fixé.

**Exercice 19**

On cherche toutes les fonctions  $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  vérifiant :

$$\frac{\partial g}{\partial x} - \frac{\partial g}{\partial y} = a,$$

où  $a$  est un réel.

- On pose  $f$  la fonction de  $\mathbb{R}^2$  dans  $\mathbb{R}$  définie par :  $f(u, v) = g\left(\frac{u+v}{2}, \frac{v-u}{2}\right)$ . En utilisant le théorème de composition, montrer que  $\frac{\partial f}{\partial u} = \frac{a}{2}$ .
- Intégrer cette équation pour en déduire l'expression de  $f$ .
- En déduire les solutions de l'équation initiale.

**Exercice 20**

On pose  $f_{x,y} : \begin{matrix} [-1,1] & \rightarrow & \mathbb{R} \\ t & \mapsto & xt^2 + yt \end{matrix}$  puis  $F(x, y) =$

$$\sup_{t \in [-1,1]} f_{x,y}(t).$$

Étudier la continuité de  $F$  sur  $\mathbb{R}^2$ .

